

**BULA PARA O PACIENTE**  
**LUFTAL MAX comprimidos mastigáveis e cápsulas gelatinosas**

**LUFTAL MAX<sup>®</sup>**

simeticona

ATENÇÃO: O NOME DA SUBSTÂNCIA ATIVA DE LUFTAL MAX FOI MODIFICADO DE DIMETICONA PARA SIMETICONA. A QUALIDADE, SEGURANÇA E EFICÁCIA DO PRODUTO PERMANECEM INALTERADAS.

Comprimidos mastigáveis e cápsulas gelatinosas

USO ORAL

**APRESENTAÇÃO**

**LUFTAL MAX mastigável** é apresentado em embalagens com 10 comprimidos mastigáveis.

**LUFTAL MAX cápsulas gelatinosas** é apresentado em embalagens com 10 cápsulas gelatinosas.

**USO ADULTO**

**COMPOSIÇÃO**

Cada **comprimido mastigável** contém 125 mg de simeticona.

Ingredientes inativos: fosfato tricálcico, polivinilpirrolidona, dextrose anidra, sacarina sódica, corante amarelo DC n<sup>o</sup> 10 laca, aroma de limão, estearato de magnésio.

Cada **cápsula gelatinosa** contém 125 mg de simeticona.

Ingredientes inativos: óleo de menta, gelatina, sorbitol, metilparabeno, propilparabeno, corante verde 3, água purificada.

**AÇÃO DO MEDICAMENTO**

LUFTAL MAX atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos fluidos digestivos, rompendo ou dificultando a formação de bolhas gasosas que retêm os gases e que provocam flatulência e dores abdominais.

**INDICAÇÕES DO MEDICAMENTO**

LUFTAL MAX é indicado para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. O acúmulo de gases no estômago e no intestino chama-se flatulência, que causa desconforto abdominal, estufamento, dor ou cólicas no abdômen. A eliminação dos gases aliviam estes sintomas.

LUFTAL MAX também pode ser usado como medicação auxiliar no preparo dos pacientes em exames médicos como na endoscopia digestiva e/ ou colonoscopia.

**RISCOS DO MEDICAMENTO**

**Contra-indicações**

Você não deve utilizar LUFTAL MAX se tiver alergia ou sensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Não use LUFTAL MAX se você apresentar algum dos seguintes sintomas:

- Distensão abdominal grave;
- Cólica grave;
- Sensibilidade exacerbada à dor (mais que 36 horas);
- Massa abdominal palpável.

### **Advertências**

Não existem recomendações especiais para pacientes geriátricos. LUFTAL MAX não é indicado para pacientes pediátricos.

### **Precauções**

Não exceda a dose recomendada.

### **Interações Medicamentosas**

Não são conhecidas interações de LUFTAL MAX com outros medicamentos ou alimentos.

**Atenção: LUFTAL MAX comprimidos mastigáveis contém Açúcar, portanto, se você é diabético, use este medicamento com cautela.**

**Se você estiver grávida ou amamentando, você deve informar seu médico antes de usar este medicamento.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.**

**Não há contra-indicação relativa a faixas etárias.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

## **MODO DE USO**

### **Aspecto físico e características organolépticas**

**LUFTAL MAX comprimidos mastigáveis** têm forma redonda, cor amarela e sabor limão.

**LUFTAL MAX cápsulas gelatinosas** são moles, com forma oval, cor verde e contêm um líquido branco com cheiro e sabor de menta. É normal a presença de um conteúdo interno opaco nas cápsulas gelatinosas.

### **Como usar**

Ao utilizar **LUFTAL MAX cápsulas gelatinosas**, você deve engolir a cápsula, e não mastigá-la. As cápsulas gelatinosas são moles e fáceis de engolir.

Ao utilizar **LUFTAL MAX comprimidos mastigáveis**, você não deve engolir o comprimido por inteiro, mas sim mastigá-lo completamente.

### **Posologia**

Você pode usar LUFTAL MAX 4 vezes ao dia, após as refeições e ao se deitar, ou quando recomendado pelo seu médico.

Você não deve ingerir mais de 500 mg (4 comprimidos ou cápsulas) de LUFTAL MAX por dia.

**Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.**

**Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**

**As cápsulas gelatinosas não podem ser partidas nem mastigadas.**

## **REAÇÕES ADVERSAS**

A simeticona não é absorvida pelo organismo. Ela atua somente dentro do aparelho digestivo, e é totalmente eliminada nas fezes, sem alterações. Portanto, reações indesejáveis são menos prováveis de ocorrer.

- Risco de eczema de contato;
- Em casos raros: reações imediatas como urticaria e broncoespasmo.

**Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.**

## **CONDUTA EM CASO DE SUPERDOSE**

Experiência de superdose após a comercialização é limitada, sendo registrada com ou sem sintomas. Sintomas podem incluir diarreia e dor abdominal.

Caso você, acidentalmente, use LUFTAL MAX em uma quantidade maior do que a recomendada, você deve procurar um médico imediatamente.

## **CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO**

**LUFTAL MAX comprimidos mastigáveis e cápsulas gelatinosas** à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) e protegidos de umidade e calor excessivo.

A presença de um conteúdo interno opaco nas cápsulas gelatinosas é característica normal do produto.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**\*\*\*no do lote, data de fabricação e de validade: vide cartucho.**

Reg. MS- 1.0180.0120

Farm. Bioq. Resp  
Dra. Tathiane Aouki de Souza  
CRF-SP nº 26.655

Fabricado por:  
Luftal Max Cápsulas Gelatinosas  
Catalent Brasil Ltda. – Sorocaba – SP

Luftal Max Comprimidos Mastigáveis  
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica S.A.  
Rua Carlos Gomes, 924 – Santo Amaro – São Paulo – SP  
CNPJ: 56.998.982/0001-07  
Indústria Brasileira

Embalado por, Distribuído por:  
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica S.A.  
Rua Carlos Gomes, 924 – Santo Amaro – São Paulo – SP



12/05/09