

# THIOMUCASE

MUCOPOLISSACARIDASE



## FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

**THIOMUCASE** (mucopolissacaridase) **creme** - bisnaga com 45 gramas.

## USO ADULTO

## COMPOSIÇÃO

Cada grama contém 135 TRU de mucopolissacaridase.

Excipientes: aroma artificial de rosas, estearato de glicerila, oleato de decila, álcool cetosteárico etox, glicerina, metilparabeno, água purificada.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Este medicamento contém em sua fórmula substâncias que agem especialmente sobre o tecido subcutâneo reduzindo o edema e as distrofias localizadas. O produto deve ser mantido ao abrigo da luz, em lugar fresco e conservado na embalagem original mesmo depois de aberto. O prazo de validade encontra-se impresso na embalagem externa. Não utilize medicamento com prazo de validade vencido. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentan-

do. Apenas o médico poderá decidir sobre o uso deste produto nesses períodos. Informe ao seu médico sobre o aparecimento de quaisquer reações desagradáveis com o uso deste medicamento.


**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Este produto é contra-indicado para pessoas com alergia a qualquer componente da fórmula.

**NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Este medicamento (fator de difusão enzimática) é composto de mucopolissacaridasas com atividades condroitínica e hialuronidásica, despolimerizando os mucopolissacarídeos (ácido condroitino-sulfúrico,



ácido hialurônico) da substância fundamental do tecido conjuntivo, especialmente subcutâneo.

A despolimerização da substância fundamental das trabéculas conjuntivas do tecido subcutâneo facilita as trocas metabólicas locais.

## **INDICAÇÕES**

Tratamento das distrofias localizadas do tecido subcutâneo. É também utilizado no tratamento dos edemas traumáticos, flebóticos ou cirúrgicos.

## **CONTRA-INDICAÇÕES**

PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE À QUALQUER COMPONENTE DA FÓRMULA.

## **PRECAUÇÕES**

NÃO EXISTEM ESTUDOS ESPECÍFICOS SOBRE O USO DESTE MEDICAMENTO DURANTE A GRAVIDEZ E LACTAÇÃO. ASSIM, NESSES CASOS RECOMENDA-SE

## **AVALIAÇÃO MÉDICA.**

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**  
NÃO SÃO CONHECIDAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ESPECÍFICAS.

**REAÇÕES ADVERSAS**  
AINDA NÃO SÃO CONHECIDAS A INTENSIDADE E A FREQUÊNCIA DAS REAÇÕES ADVERSAS.

## **POSOLOGIA**

Aplicação tópica externa.  
Aplicar duas vezes ao dia, com leve massagem.

## **SUPERDOSAGEM**

Não foram descritos casos de superdose.

## **Pacientes Idosos**

Não há restrições ou recomendações especiais com relação ao uso do produto por pacientes com idade acima de 65 anos.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: ver cartucho. Ind. Bras.  
Reg. MS nº 1.0394.0489 - Farm. Resp.: J.G. Rocha CRF/SP nº 4067 - CNPJ 61.150.819/0001-20



**FARMASA**

**LABORATÓRIO AMERICANO DE FARMACOTERAPIA S.A.**

RUA NOVA YORK, 245 - 04560-908 - SÃO PAULO - SP - SAC 0800 11 4033 - [www.farmasa.com.br](http://www.farmasa.com.br)