



Item: Bula - 707990 - L-53 - FRENTE
Produto: TAMARINE Cápsulas
Dimensões: 135 X 160 mm
Cor: Preto
Acabamento: bula aberta
Motivo da alteração: Adequação ao padrão Farmasa
Data: 20/12/2006

CRW
Artes
em embalagens
Farmacêuticas

crwdesign@ajato.com.br

TAMARINE®

Cassia angustifolia Vahl - *Tamarindus indica* L.
Cassia fistula L. - *Coriandrum sativum* L.

 **Barrenne**

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES:
TAMARINE®, sob a forma de cápsulas, é apresentado em cartuchos contendo 20 cápsulas e 100 cápsulas.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO (EXCLUSIVAMENTE A CRITÉRIO MÉDICO)
USO ORAL

Composição:

Cada cápsula contém:

<i>Cassia angustifolia</i> Vahl.....	240,00 mg
(pó de folhas de sena contendo 2,5% em senosídeos B)	
<i>Tamarindus indica</i> L.	11,70 mg
(extrato seco)	
<i>Cassia fistula</i> L.	11,70 mg
(extrato seco)	
<i>Coriandrum sativum</i> L.	5,40 mg
(pó)	
Excipiente q.s.p.	270,00 mg
(estearato de magnésio)	

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento:

TAMARINE® é um laxativo indicado em casos de constipação intestinal (prisão de ventre) e perturbações organo-funcionais da motricidade intestinal. Cuidados de armazenamento: TAMARINE® cápsulas deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) em local seco e ao abrigo da luz.

Prazo de validade: o prazo de validade do TAMARINE® cápsulas, é de 24 meses após a data de fabricação, conforme indicado na embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Gravidez e lactação: informe seu médico da ocorrência de gravidez durante o tratamento ou se estiver amamentando. Somente o médico pode avaliar a conveniência do uso do TAMARINE® em qualquer fase da gestação ou amamentação.

Cuidados de administração: siga sempre a orientação do seu médico. Recomenda-se o uso do TAMARINE® após a última refeição. O período estimado de início da ação do produto é de aproximadamente 8 horas após a ingestão.

Reações adversas: informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis tais como cólicas abdominais, vômitos ou diarreias, caso persistam, mesmo após diminuição ou espaçamento das doses.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Ingestão com outras substâncias: usar o produto com cautela em pacientes em uso de antiarrítmicos tipo quinidina, amiodarona, vincamina, digitálicos, anfotericina B e diuréticos hipocalemiantes. Não há relatos de interação com alimentos.

Contra indicações e precauções: TAMARINE® é contra-indicado nas retocolites e doença de Crohn. Também é contra-indicado em síndromes dolorosas abdominais de causa desconhecida. Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

O uso de TAMARINE® em crianças só deve ser feito quando houver indicação médica.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

Pacientes idosos devem iniciar o tratamento utilizando 1 cápsula recomendada para adultos, ajustando a dose, se necessário.

ATENÇÃO: TAMARINE® CÁPSULAS NÃO CONTÉM AÇÚCAR O QUE POSSIBILITA SEU USO POR PACIENTES DIABÉTICOS E TAMBÉM POR AQUELES QUE FAZEM DIETAS RESTRITIVAS AO USO DE AÇÚCAR.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características:

TAMARINE® é uma associação sinérgica de diferentes plantas medicinais com efeito laxativo encontradas na forma de cápsulas. TAMARINE® é um laxativo que provoca uma ativação fisiológica das secreções das mucosas do trato digestivo, preservando todas as características da função



FARMASA

Item: Bula - 707990 - L-53 - **VERSO**
Produto: TAMARINE Cápsulas
Dimensões: 135 X 160 mm
Cor: Preto
Acabamento: bula aberta
Motivo da alteração: Adequação ao padrão
Farmasa
Data: 20/12/2006

CRW
Artes
em embalagens
Farmacêuticas

crwdesign@ajato.com.br

intestinal normal sem nenhum sinal de irritação. A apresentação de TAMARINE® em cápsulas possibilita o seu uso por pacientes diabéticos, uma vez que o produto não contém açúcar em sua formulação.

INDICAÇÕES

As indicações de TAMARINE® são amplas: todas as relacionadas a uma perturbação organo-funcional da motricidade intestinal; tratamento sintomático da constipação, tanto crônica como secundária; preparação para os exames radiológicos e endoscópicos.

Indicações terapêuticas complementares: constipação decorrente de viagens prolongadas, período menstrual, gestação, dietas pós-operatórias e acidentes vasculares cerebrais.

CONTRA-INDICAÇÕES

TAMARINE® É CONTRA-INDICADO NAS RETOCOLITES E DOENÇA DE CROHN. TAMBÉM É CONTRA-INDICADO EM SÍNDROMES DOLOROSAS ABDOMINAIS DE CAUSA DESCONHECIDA. HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

PRECAUÇÕES

O USO DE TAMARINE® EM CRIANÇAS SÓ DEVE SER FEITO QUANDO HOUVER INDICAÇÃO MÉDICA.

REAÇÕES ADVERSAS

INFORME SEU MÉDICO O APARECIMENTO DE

REAÇÕES DESAGRADÁVEIS TAIS COMO CÓLICAS ABDOMINAIS, VÔMITOS OU DIARRÉIAS, CASO PERSISTAM MESMO APÓS DIMINUIÇÃO OU ESPAÇAMENTO DAS DOSES.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

USAR O PRODUTO COM CAUTELA EM PACIENTES EM USO DE ANTIARRÍTMICOS TIPO QUINIDINA, AMIODARONA, VINCAMINA, DIGITÁLICOS, ANFOTERICINA B E DIURÉTICOS HIPOCALEMIANTES.

POSOLOGIA

Adultos e crianças acima de 12 anos: 1 a 2 cápsulas ao dia após a última refeição ou a critério médico.

Crianças menores de 12 anos: a exclusivo critério médico.

Nota: a individualização da dose é aconselhável, podendo a mesma ser aumentada nos casos de obstipação rebelde.

SUPERDOSAGEM

A superdosagem ocasiona diarreia e perda hidroeletrólítica.

PACIENTES IDOSOS

Devem iniciar o tratamento utilizando 1 cápsula recomendada para adultos, ajustando a dose, se necessário.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Nº do lote, data de fabricação, prazo de validade: vide cartucho.
Farm. Resp.: Antonia Ausina Febrer CRF-RJ nº 3898 - MS-1.0464.0009 - SAC.: 0800 114033
CNPJ 33.043.308/0001-73 Indústria Brasileira



Barrenne Indústria Farmacêutica Ltda.
Rua Antunes Maciel, 68/86 - São Cristóvão - CEP 20940-010
Rio de Janeiro-RJ - www.barrenne.com.br

707990