



Transpulmin®
eucaliptol 100mg/g
mentol 50mg/g
cânfora 25mg/g
guaiacol 10mg/g

Cada g de bálsamo contém 25 mg de cânfora, 100 mg de eucaliptol, 50 mg de mentol e 10 mg de guaicol. Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, dióxido de silício, oleato de decila, água purificada, monoestearato de glicerila auto-emulsionável e petrolato.

Precauções: apenas para uso externo. Evitar o contato com os olhos. Não ingerir ou aplicar nas narinas. Tosse persistente pode ser sinal de uma condição mais séria. Se a tosse ou outros sintomas persistirem por mais de uma semana, ou se acompanhada por febre, erupção cutânea ou dor de cabeça persistente, descontinue o uso do produto e consulte um médico. Não utilize este produto para tosse persistente ou crônica, derivadas do hábito de fumar, asma, enfisema ou se a tosse for acompanhada de secreção excessiva, a não ser quando sob orientação médica. Não aplique sobre feridas ou lesões da pele. Em caso de ingestão acidental, procure ajuda profissional ou contate imediatamente um centro de intoxicação.

Modo de usar: Adultos e crianças acima de 2 (dois) anos: Friccionar 4 cm de bálsamo sobre o peito e o dorso. Não aplicar o bálsamo diretamente nas narinas ou no rosto. Repetir 3 a 4 vezes ao dia ou segundo orientação médica. **Em inalações:** colocar 1 a 3 cm de bálsamo no fundo de um recipiente e colocar água quente (aquecer a água até começar a formar pequenas bolhas, desligar o fogo e transferir a água cuidadosamente para o recipiente), de maneira a formar vapores medicamentosos necessários para as inalações. **Indicações: TRANSPULMIN® Bálsamo** está indicado para o alívio temporário da congestão nasal e tosse associadas a gripes e resfriados. **Contra-indicações: O medicamento não deve ser utilizado por pacientes alérgicos a qualquer componente da fórmula. Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade. Não aqueça a embalagem. Nunca exponha TRANSPULMIN® ao fogo, microondas ou coloque em recipientes sob fervura.**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.



F. 86
PH 117

MS - 1.0573.0355.001-4
Farmacêutico Responsável:
Dr. Wilson R. Farias CRF-SP nº 9555
Marca registrada de MEDA PHARMA GmbH & Co. KG.
Frankfurt - Alemanha
Achê Laboratórios Farmacêuticos S.A.
Via Dutra, km 222,2 - Guarulhos - SP
CNPJ 60.659.463/0001-91 - Indústria Brasileira

CÓDIGO DE BARRAS

Transpulmin® bals x 20 g

Nº 7 8966580 0589 3

MAGNITUDE:

29,83 x 21,00

Impressão P. 348 C

Raspe suavemente
com objeto de metal



CPD 2171203 11/06
RO 002

achê

Transpulmin®

BÁLSAMO

Nova
Embalagem

eucaliptol 100mg/g • mentol 50mg/g
cânfora 25mg/g • guaicol 10mg/g

Uso adulto e pediátrico

20 g

Somente para USO EXTERNO E INALAÇÃO - NÃO INGERIR

t r a n s p u l m i n b á l s a m o

Conservar em temperatura ambiente
(entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

Informações ao paciente, Indicações,
Contra-indicações e Precauções: vide cartucho.

**Este medicamento não deve ser utilizado
em crianças menores de 2 anos de idade.**

CAC - 0800 701 6900

MS - 1.0573.0355

Farmacêutico Responsável:

Dr. Wilson R. Farias CRF-SP nº 9555

Marca registrada de MEDA PHARMA GmbH & Co. KG.
Frankfurt - Alemanha.

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

Via Dutra, km 222,2 - Guarulhos - SP

CNPJ 60.659.463/0001-91

Indústria Brasileira

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS,
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

achê

Transpulmin®

BÁLSAMO

eucaliptol 100mg/g • mentol 50mg/g
cânfora 25mg/g • guaicol 10mg/g

20 g

Somente para USO EXTERNO E INALAÇÃO - NÃO INGERIR