



Ph code 097

TALERC

cloridrato de epinastina

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Comprimidos revestidos - Xarope
Comprimidos revestidos de 10 mg: embalagens com 10 comprimidos.
Comprimidos revestidos de 20 mg: embalagem com 10 comprimidos.
Xarope: frascos com 50 ml acompanhados de copo-medida.

QUANTIDADES EM UNIDADES

Comprimidos revestidos de 10 mg
Contém: 10 comprimidos revestidos
Comprimidos revestidos de 20 mg
Contém: 10 comprimidos revestidos

VOLUME LÍQUIDO

Xarope - conteúdo: 50 ml

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido revestido 10 mg contém:
cloridrato de epinastina10 mg
Excipientes: lactose monoidratada, amido, povidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, hipromelose, eudragit, macrogol, talco, dióxido de titânio e silicone.
Cada comprimido revestido 20 mg contém:
cloridrato de epinastina20 mg
Excipientes: lactose monoidratada, amido, povidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, hipromelose, eudragit, macrogol, talco, dióxido de titânio e silicone.
Cada 5 ml de xarope contém:
cloridrato de epinastina10 mg
Excipientes: glicirrizinato de amônio, fosfato de sódio monobásico diidratado, carmelose sódica, essência de cereja, essência de mentol, propilenoglicol, água, sorbitol e hidróxido de sódio.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- **Como este medicamento funciona?**
TALERC comprimidos revestidos/xarope possui atividade bloqueadora dos receptores H1 de grande seletividade e especificidade, com potente efeito antialérgico e anti-histamínico.
- **Por que este medicamento foi indicado?**
TALERC comprimidos revestidos/ xarope é indicado para o tratamento de alergias.
- **Quando não devo usar este medicamento?**
TALERC NÃO DEVE SER USADO EM PACIENTES QUE APRESENTAM ALERGIA A QUAISQUER DOS COMPONENTES DO MEDICAMENTO.
- **ESTE MEDICAMENTO É CONTRA-INDICADO A CRIANÇAS MENORES DE 6 ANOS DE IDADE.**
- **TALERC pode ser utilizado com outros medicamentos?**
Não existe prova suficiente de que **TALERC** potencialize o efeito sedativo de hipnóticos, anti-histamínicos ou álcool. Entretanto, deve-se evitar o uso concomitante de tais substâncias.
- **Durante o tratamento com TALERC pode-se tomar bebidas alcoólicas?**
Evite a ingestão de bebida alcoólica durante o tratamento.

INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES DESAGRADÁVEIS.

INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SOBRE QUALQUER MEDICAMENTO QUE ESTEJA USANDO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O TRATAMENTO.
INFORME LOGO AO SEU MÉDICO A OCORRÊNCIA DE GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO OU APÓS O SEU TÉRMINO. INFORME AO MÉDICO SE ESTÁ AMAMENTANDO

- **Como devo usar este medicamento?**
A via de administração é oral. O comprimido revestido de **TALERC** deve ser tomado sem mastigar, com um pouco de líquido.
Para o tratamento de patologias dermatológicas alérgicas:
Adultos: tomar um comprimido de 20 mg, uma vez ao dia.
Para o tratamento de rinite alérgica:
Adultos: tomar um comprimido de 10 ou 20 mg, uma vez ao dia. A dose deve ser ajustada individualmente, de acordo com a gravidade dos sintomas.
Crianças de 6 a 12 anos: 5 a 10 mg (2,5 ml a 5 ml), uma vez ao dia.
- **SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO-DENTISTA.**
- **Qual é o aspecto deste medicamento?**
TALERC comprimidos revestidos possui a forma redonda, biconvexa, de cor variando de branco a amarelo.

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA BULA				
Bula Talerc	Arq.: 1556831 BL Talerc.XPF-CPR			
Código: 155683-1	Substância: 155586-2	Revisão: 01	Laus: 097	
Data: 07/12/2006				
Dimensões externas:	300 x 135 ± 1,0 mm			
Materiais: Print Max				
Gramatura: 50 ± 2,5 g / m²				
Fibras: no mesmo sentido da medida 135 mm				
Impressão: frente e verso na cor:				
Acreditamento: Macec com 500 unidades protegidas por catapalpa nas extremidades, dispostas em caixas com 3.000 un e envoltas por shrink ou papel kraft em caixas identificadas individualmente.				
Dobragem: Sem dobragem				
Mudou nesta arte: Layout Ativa				

PH 097 BL 0065300 - BU 02 - 12/06

155683-1
CL 097

135 mm

300 mm



TALERC xarope apresenta-se na forma de líquido límpido, incolor ou levemente amarelado com odor característico de cereja.

- Quais os males que este medicamento pode causar?

COMO REAÇÕES ADVERSAS RELATARAM-SE SONOLÊNCIA, DOR DE CABEÇA, FADIGA, SECURA DA BOCA, TONTURA E DESCONFORTO GASTRINTESTINAL.

- O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?

Em caso de superdose, a conduta a ser adotada é a lavagem gástrica e/ou diurese forçada, além de tratamento sintomático.

- Onde e como devo guardar este medicamento?

Como todo medicamento, **TALERC** deve ser guardado em sua embalagem original até sua total utilização. Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15° e 30°C). Proteger da luz e umidade. O xarope deve ser armazenado bem fechado.

- Qual o prazo de validade de TALERC?

O prazo de validade de **TALERC** comprimidos revestidos é de 24 meses a contar da data de sua fabricação indicada na embalagem do produto

O prazo de validade de **TALERC** xarope é de 18 meses a contar da data de sua fabricação indicada na embalagem do produto.

Ao utilizar o medicamento, confira sempre seu prazo de validade. Nunca use medicamento com o prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado, as substâncias podem estar alteradas e causar prejuízo para a sua saúde.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

DIZERES LEGAIS:

MS - 1.0573.0364

Farmacêutico Responsável:

Dr. Wilson R. Farias CRF-SP nº 9555

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

Via Dutra, km 222,2 - Guarulhos - SP

CNPJ 60.659.463/0001-91

Indústria Brasileira

Fabricado por:

Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda

Itapecerica da Serra-SP

Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem externa

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.



155683-1
CL 097

PH 097 BL 0065300 - BU 02 - 12/06