

# BISMU-JET®

## neomicina + tartarato de bismuto e sódio + cloridrato de procaína

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Suspensão oral: Embalagem frasco de 20 ml.

### USO TÓPICO

#### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada ml (20 gotas) da suspensão oral contém:

neomicina (na forma de sulfato) .....	15 mg
tartarato de bismuto e sódio .....	25 mg
cloridrato de procaína .....	15 mg
veículo* q.s.p. ....	1 ml

\*mentol, sacarina sódica, propilenoglicol, hidróxido de sódio, glicerol, álcool etílico, água purificada.

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### Ação esperada do medicamento

Bismu-jet® é um bacteriostático e bactericida, o qual é usado em afecções bucais.

#### Cuidados de armazenamento

Mantenha à temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteger da luz e manter em lugar seco.

#### Prazo de validade

O número do lote e as datas de fabricação e validade deste medicamento estão impressos no cartucho do medicamento. Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

#### Gravidez e lactação

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao médico se está amamentando.

#### Cuidados de administração

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

#### Interrupção do tratamento

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

#### Reações adversas

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

### TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

### Contra-indicações e precauções

Bismu-jet® é contra-indicado a pacientes com alergia aos componentes de sua fórmula.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

**NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.**

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

#### CARACTERÍSTICAS

Bismu-jet® possui em sua composição o sulfato de neomicina, o qual tem ação bacteriostática e que se torna bactericida quando elevada sua concentração, o tartarato de bismuto e sódio que possui ação bactericida direta *in vitro* sobre o estreptococo. O estreptococo é o agente etiológico único na angina pultácea. Possui também o cloridrato de procaína que age como anestésico sobre a região inflamada, aliviando ao dor.

### INDICAÇÕES

Bismu-jet® está indicado como medicação tópica auxiliar no tratamento das afecções bucais.

### CONTRA-INDICAÇÕES

Bismu-jet® está contra-indicado a pacientes que tenham demonstrado hipersensibilidade a seus componentes.

### REAÇÕES ADVERSAS

Bismu-jet® não apresentou reações adversas até o momento.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

Gotas: pingar 1 a 2 gotas sobre o local afetado, 3 a 6 vezes ao dia.

#### AGITE ANTES DE USAR.

### PACIENTES IDOSOS

Não constam na literatura relatos sobre advertências ou recomendações especiais do uso adequado por pacientes idosos.

### SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Registro M.S. nº 1.0583.0102

Farm. Resp.: Drª Maria Geisa P. de Lima e Silva - CRF-SP nº 8.082

### Nature's Plus Farmacêutica Ltda.

Rodovia SP 101, km 08  
Hortolândia/SP – CEP 13186-901  
CNP.J: 45.992.062/0001-65  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Fabricado por: EMS S/A.

Rodovia SP 101, km 08  
Hortolândia/SP – CEP 13186-901

Nº do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho.



SAC  
0800 191914