

Andolba®

benzocaína  
mentol  
cloreto de benzetônio  
benzoxiquina

ANTI-SÉPTICO, ANTIPRURIGINOSO E ANESTÉSICO TÓPICO

## FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO - Andolba

AEROSSOL.  
EMBALAGEM CONTENDO 1 TUBO COM 43 g.  
USO ADULTO  
SOMENTE PARA USO EXTERNO

## COMPOSIÇÃO - Andolba

Cada g da solução concentrada contém:

benzoxiquina .....12,00 mg  
mentol ..... 5,00 mg  
cloreto de benzetônio .....1,00 mg  
benzocaína ..... 45,00 mg  
Veículo q.s.p. ....1,00 g

Cada tubo de 43 g contém:

Solução concentrada ..... 26 g  
Propelente inerte (butano) ..... 17 g  
TOTAL ..... 43 g

Componentes inativos: Óleo de soja refinado, óleo de mamona, metilparabeno, álcool isopropílico.

Propelente inerte: Butano.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE - Andolba

### AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO - Andolba

Andolba® (benzocaína, mentol, cloreto de benzetônio e benzoxiquina) contém como componentes um anti-séptico, um antipruriginoso e um anestésico tóxico. É indicado para alívio da dor e da coceira, principalmente nos casos de queimaduras solares, pequenos ferimentos na pele, abrasões, picadas de insetos, queimaduras leves, no pósepsiotomia e hemorroidectomia e também na prevenção de infecções em pequenos ferimentos da pele, arranhaduras e pequenas queimaduras. Andolba® (benzocaína, mentol, cloreto de benzetônio e benzoxiquina) tem ação rápida e proporciona uma sensação refrescante e agradável.

Informe ao médico caso os sintomas persistam ou ocorrerem reações desagradáveis durante o uso do produto. Tal como é aconselhável com todos os medicamentos, se você estiver grávida ou amamentando, procure orientação médica antes de usar este produto.

### CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO - Andolba

Andolba® (benzocaína, mentol, cloreto de benzetônio e benzoxiquina) deve ser armazenado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

### PRAZO DE VALIDADE - Andolba

Desde que observados os devidos cuidados de conservação, o prazo de validade do Andolba® (benzocaína, mentol, cloreto de benzetônio e benzoxiquina) é de 24 meses, contados a partir da data de fabricação impressa em sua embalagem externa.

**NÃO USE MEDICAMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO.**

### **GRAVIDEZ E LACTAÇÃO - Andolba**

Informe ao seu médico a ocorrência de **gravidez** na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao seu médico se está amamentando.

### **CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO - Andolba**

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Após aplicação do produto, aguardar sua total absorção pela pele para evitar manchas em roupas.

### **INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO - Andolba**

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico, somente o médico poderá avaliar a eficácia da terapia. A interrupção do tratamento pode ocasionar a não obtenção dos resultados esperados.

### **REAÇÕES ADVERSAS - Andolba**

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

### **CONTRA-INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES - Andolba**

CONTEÚDO SOB PRESSÃO. INFLAMÁVEL. O VASILHAME MESMO VAZIO, NÃO DEVE SER PERFURADO. NÃO USE EM LUGAR QUENTE, PRÓXIMO A CHAMAS OU ESPOSTO AO SOL. NUNCA COLOQUE A EMBALAGEM NO FOGO OU INCINERADORO.

Evite inalar. Proteja os olhos durante a aplicação. Não ingerir .

O uso deste medicamento é contra indicado em casos de hipersensibilidade conhecida a Benzocaína, Mentol, Cloreto de Benzetônio, Benzoxiquina e/ou aos demais componentes da formulação.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

**NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.**

### **INFORMAÇÕES TÉCNICAS - Andolba**

Andolba® (benzocaína, mentol, cloreto de benzetônio e benzoxiquina) destina-se ao uso **tópico**, devido suas propriedades anti-séptica, antipruriginosa e anestésica.

Pode, inclusive, ser indicado na pós episiotomia e hemorroidectomia. Andolba® (benzocaína, mentol, cloreto de benzetônio e benzoxiquina) contém em sua composição, a benzoxiquina, o cloreto de benzetônio, o mentol e a benzocaína. A benzoxiquina (benzoato de 8-hidroxiquinolina) é um anti-séptico **tópico**. O cloreto de benzetônio é um sal de amônio quaternário com propriedades anti-sépticas.

O mentol é um antipruriginoso **tópico** cujas propriedades incluem também um leve efeito anestésico.

Aplicado sobre a pele, dilata os **vasos sanguíneos** superficiais, proporcionando uma sensação de frescor. A benzocaína é um anestésico local **tópico** para uso na pele ou **mucosa**. Quimicamente é um éster derivado do PABA. É fracamente solúvel em água e conseqüentemente é lentamente absorvida, desta maneira permanece no local aplicado por um longo período de tempo, produzindo uma ação

anestésica prolongada. Seu uso local é indicado em associação com anti-sépticos.

## **INDICAÇÕES - Andolba**

Andolba® (benzocaína, mentol, cloreto de benzetônio e benzoxiquina) é indicado como anti-séptico, antipruriginoso e anestésico **tópico**, para o alívio rápido e temporário das dores e pruridos da pele conseqüentes às queimaduras solares, pequenos ferimentos, picadas de inseto, abrasão, queimaduras leves, nos pós episiotomia e hemorroidectomia.

Andolba® (benzocaína, mentol, cloreto de benzetônio e benzoxiquina) também pode ser indicado na prevenção em pequenos ferimentos, queimaduras leves e arranhaduras.

## **CONTRA-INDICAÇÕES - Andolba**

O uso deste medicamento é contra indicado em casos de hipersensibilidade conhecida a Benzocaína, Mentol, Cloreto de Benzetônio, Benzoxiquina e/ou aos demais componentes da formulação. Hipersensibilidade ao PABA e seus derivados devido a possibilidade cruzada. **Andolba**® (benzocaína, mentol, cloreto de benzetônio e benzoxiquina ) não deve ser usado em áreas de pele lesada ou infectada, em feridas abertas ou em queimaduras graves.

## **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS - Andolba**

Não utilizar o produto por tempo prolongado sem orientação médica. Caso os **sintomas** persistirem por mais de 7 dias ou houver piora, inclusive se a região ficar avermelhada ou irritada, descontinuar o uso do produto e consultar um médico. Não aplicar **Andolba**® (benzocaína, mentol , cloreto de benzetônio e benzoxiquina) nos olhos, nos ouvidos, nas narinas, na boca ou na garganta. Não deve ser inalado.

## **REAÇÕES ADVERSAS - Andolba**

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

## **POSOLOGIA E MODO DE USAR - Andolba**

Uso adulto e crianças maiores de 12 anos.

Uso **tópico** externo, sob a forma de aerossol.

Limpar a região afetada usando sabão neutro e água abundante. Enxugar com uma toalha seca e limpa ou gaze apropriada. Segurar o tubo de 15 a 30 cm de distância, apontando para a região afetada e acionar a válvula por alguns segundos. Aplicar 3 ou 4 vezes ao dia. Deve ser aplicado diretamente nas áreas afetadas. Para aplicar no rosto, coloque uma quantidade na palma das **mãos** e espalhe no local afetado.

## **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS QUANTO A ADMINISTRAÇÃO - Andolba**

Evite inalar. Proteja os olhos durante a aplicação. Não ingerir. A dose e freqüência podem ser aumentadas exclusivamente sob supervisão médica e de acordo com as necessidades do paciente.

## **PRECAUÇÕES DE ARMAZENAGEM - Andolba**

Conteúdo sob pressão. Inflamável. O vasilhame mesmo vazio, não deve ser perfurado. Não use em lugar

quente, próximo a chamas ou exposto ao sol. Nunca coloque a embalagem no fogo ou incinerador.

### **SUPERDOSAGEM - Andolba**

Em casos de sobredosagem por ingestão acidental ou inalação excessiva, procure imediatamente orientação médica.

**VENDA SEM RECEITUÁRIO MÉDICO.**

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Nº do lote, prazo de validade e data de fabricação: vide  
Cartucho