

Descrição do produto

Anaerocid Apresentação do Anaerocid: 300mg com 16 Cápsulas Efeitos Colaterais da Anaerocid - Fosfato de Clindamicina Obter ajuda médica de emergência se você tiver algum destes sinais de reação alérgica a Anaerocid - Fosfato de Clindamicina: urticária, dificuldade em respirar, inchaço do rosto, lábios, língua ou garganta. Suspenda o uso de Anaerocid - Fosfato de Clindamicina e chame o médico imediatamente se tiver quaisquer dos seguintes efeitos colaterais graves:

- diarreia, que é aquosa ou sanguinolenta;
- icterícia (amarelamento da pele ou dos olhos);
- urinar menos que o habitual ou não em todos;
- febre, calafrios, dores no corpo, sintomas de gripe, úlceras na boca e garganta;
- erupção cutânea grave com formigamento, dormência, dor, fraqueza muscular;
- fácil sangramento, hematomas não usuais (nariz, boca, vagina ou reto), spots identificar roxo ou vermelho sob a pele, ou
- febre, garganta inflamada e dores de cabeça com uma grave bolhas, descamação e erupções vermelhas na pele.

Efeitos colaterais menos graves à Anaerocid - Fosfato de Clindamicina podem incluir:

- mudança nos hábitos intestinais (especialmente em idosos);
- náuseas ligeiras, vômitos, ou dor de estômago;
- dor nas articulações;
- coceira ou corrimento vaginal;
- erupção cutânea ligeira ou comichão, ou
- irritação na garganta.

Esta não é uma lista completa dos efeitos secundários e outros podem ocorrer. Chame o seu médico para aconselhamento médico sobre efeitos secundários.

Contra Indicações da Anaerocid - Fosfato de Clindamicina Não use Anaerocid - Fosfato de Clindamicina se você é alérgico à Anaerocid - Fosfato de Clindamicina ou lincomicina (Bactramycin, L-Mycin, Lincocin). Não tome Anaerocid - Fosfato de Clindamicina juntamente com eritromicina (EES, EryPed, Ery-Tab, Erythrocin, e outros). Antes de utilizar a Anaerocid - Fosfato de Clindamicina, informe o seu médico se tiver doença renal, doença hepática, uma doença intestinal, como a doença de Crohn ou colite, ou antecedentes de asma, eczema, ou reação alérgica na pele. Tome a Anaerocid - Fosfato de Clindamicina por todo o tempo para o qual ela foi prescrita. Seus sintomas podem melhorar antes que a infecção esteja completamente curada. Anaerocid - Fosfato de Clindamicina não trata uma infecção viral, como o resfriado comum ou gripe. Medicamentos antibióticos podem causar diarreia, que pode ser um sinal de uma nova infecção. Se você tiver diarreia, que é aquosa ou sanguinolenta, pare de tomar Anaerocid - Fosfato de Clindamicina e chame o médico. Não use um medicamento anti-diarreia a menos que seu médico lhe indique. Para ter certeza que a Anaerocid - Fosfato de Clindamicina não está causando efeitos nocivos, o seu sangue pode precisar ser testado com frequência. Sua função renal ou hepática também pode precisar ser testada. Visite seu médico regularmente. Se você precisar de cirurgia, avise o cirurgião com antecedência que você está usando Anaerocid - Fosfato de Clindamicina. Você pode precisar parar de usar a Anaerocid - Fosfato de Anaerocid - Fosfato de Clindamicina por um curto período de tempo.

Precauções com a Anaerocid - Fosfato de Clindamicina Não use Anaerocid - Fosfato de Clindamicina se:

- For alérgico à Anaerocid - Fosfato de Clindamicina ou lincomicina (Bactramycin, L-Mycin, Lincocin), ou
- se você também está tomando eritromicina (EES, EryPed, Ery-Tab, Erythrocin, e outros).

Se você tem alguma dessas outras condições, você pode precisar de um ajuste da dose de Anaerocid - Fosfato de Clindamicina ou fazer exames especiais:

- colite, doença de Crohn, ou distúrbio intestinal
- outros;
- doença renal;
- doença hepática, ou
- história de asma, eczema, ou reação alérgica na pele.

A Anaerocid - Fosfato de Clindamicina não deve ser prejudicial para um feto. Informe o seu médico se estiver grávida ou se planeia engravidar durante o tratamento. Anaerocid - Fosfato de Clindamicina pode passar para o leite materno e pode prejudicar o bebê em amamentação. Não use Anaerocid - Fosfato de Clindamicina sem informar o seu médico caso esteja amamentando um bebê.