

Algiflex

Ibuprofeno

APRESENTAÇÃO

Comprimido revestido:

Embalagens com 20 e 200 comprimidos de 200 mg.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido contém:

Ibuprofeno

.....

..... 200 mg

Excipiente*

q.s.p.....

..... 1 com.

* (talco, glicolato de amido sódico, amido, dióxido de silício coloidal)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Conservar o produto em local seco, fresco e ao abrigo da luz em sua embalagem -original.

O número de lote e as datas de fabricação e validade de ALGIFLEX estão carimbados no cartucho do produto.

Não use ALGIFLEX com o prazo de validade vencido, pois o efeito esperado pode não ocorrer. Se houver ingestão acidental, contatar um médico ou um centro de controle de -intoxicações.

ALGIFLEX comprimido revestido deve ser tomado com leite ou comida, se ocorrer azia ou dor estomacal ocasional. O efeito começa geralmente 30 minutos após administração.

Informe ao médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando. Evitar o uso durante a gravidez ou em mulheres que estão amamentando, exceto sob orientação médica.

Não utilizar este produto se houver história anterior de alergia ao ácido acetilsalicílico ou úlcera gastroduodenal.

Não utilizar contra a dor por mais de 10 dias ou contra a febre por mais de 3 dias, a menos que seja prescrito pelo médico.

Consultar o médico se os sintomas não aliviarem, ou se ocorrerem reações desagradáveis, como, vômito, diarreia.

Não tomar com outros medicamentos contendo ibuprofeno ou outros analgésicos, exce-to sob orientação médica.

Comunicar ao médico caso esteja fazendo uso de algum medicamento.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER -PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O ibuprofeno é derivado do ácido fenilpropiônico. Sua propriedade analgésica pode ser atribuída à inibição da síntese de prostaglandina e dos tromboxanos a partir do ácido araquidônico.

Aproximadamente 80% da dose são absorvidos no trato gastrointestinal. A ação se inicia em cerca de 30 minutos e o tempo de duração analgésica é de 4 a 6 horas.

INDICAÇÕES

Na dose de 200 mg por unidade de administração por via oral, para alívio temporário da dor leve a moderada associada a resfriado comum, dor de cabeça, dor de dente, dores musculares, dismenorréia e febre.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não utilizar nos casos em que o ácido acetilsalicílico, iodeto e outros -antiinflamatórios não esteróides, inclusive o ibuprofeno, tenham induzido asma, rinite, urticária, pólipos nasais, angioedema, broncoespasmo e outros sintomas de reação alérgica ou anafilática.

Evitar o uso durante a gravidez ou em mulheres que estão amamentando, exceto por orientação médica.

PRECAUÇÕES

Os pacientes que não toleram o ácido acetilsalicílico ou qualquer dos demais analgésicos antiinflamatórios não esteróides também podem não tolerar o ALGIFLEX.

Evitar o uso simultâneo com outros analgésicos, inclusive o próprio ibuprofeno, ou ainda, medicamentos que possam causar hipoprotrombinemia, trombocitopenia ou úlcera/irritação gastrintestinal. Podem ocorrer reações de hipersensibilidade em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico e outras doenças do colágeno.

Utilizar com cautela em pacientes idosos, iniciando o tratamento com doses -reduzidas. Deve ser administrado com cautela em pacientes com desordens sanguíneas, doentes cardíacos, com úlcera péptica e aqueles que recebem anticoagulantes cumarínicos.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Evitar o uso concomitante com ácido acetilsalicílico, paracetamol, iodetos, outros antiinflamatórios não esteróides, corticotrofina uroquinase, hipoglicemiantes orais ou insulina,

anti-hipertensivos e diuréticos, ácido valpróico, plicamicina, composto de ouro, lítio e probenecida.

REAÇÕES ADVERSAS

A incidência de reações adversas é baixa, porém podem ocorrer náuseas e -vômitos, diarreia, constipação intestinal e dor epigátrica, reações de hipersensibilidade, ambliopia tóxica, elevação significativa da transaminase no soro, retenção de líquidos e edema.

Inibição da agregação plaquetária, linfopenia, anemia hemolítica, -agranulocitose, trombocitopenia, rash cutâneo, depressão e insônia.

POSOLOGIA

ADULTOS: Tomar 1 comprimido revestido a cada 4 a 6 horas. Tomar o comprimido com leite ou comida, caso ocorra azia ou dor de estômago ocasional.

CRIANÇAS: Não administrar em crianças com menos de 12 anos de idade, -exceto sob orientação e acompanhamento médico.

CONDUTA NA SUPERDOSAGEM

Os sintomas incluem vertigem, nistagmo, apnéia, inconsciência e hipotensão.

Não há antídoto específico, devendo-se promover o tratamento dos sintomas. A hipotensão pode ser minimizada com a administração de líquidos. Promover esvaziamento gástrico através da indução de vômito, lavagem gástrica, instilar carvão ativado e manter a produção de urina.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Farm. Resp.: Dra. Marcela Saad - CRF-SP nº 11.680
Registro MS 1.0235.0393
EMS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
R. Com. Carlo Mário Gardano, 450
S. B. do Campo - SP - CEP 09720-470 - Cx. Postal
351
C.G.C. 57.507.378/0001-01 - Indústria Brasileira