CLAVULIN BD

Amoxicilina Clavulanato de Potássio

- FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES:

Comprimido revestido: Embalagem com 12 comprimidos.

Suspensão oral: Embalagem com frasco de 70 ml (200mg e 400mg), acompanhado de medida dosadora.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Composição:

• Comprimido revestido

Cada comprimido revestido contém:

- . amoxicilina..... 875 mg
- . ácido clavulânico (sob a forma de clavulanato de potássio)..... 125 mg
- . excipiente q.s.p..... 1 comp.

Excipientes: estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio, dióxido de silício coloidal, celulose microcristalina, dióxido de titânio, hidroxipropilmetilcelulose, polietilenoglicol.

• Pó para suspensão oral de 200 mg e 400 mg

Cada 5 ml de suspensão oral 200 mg contém:

- . amoxicilina..... 200 mg
- . ácido clavulânico (sob a forma de clavulanato de potássio)..... 28,5 mg
- . veículo q.s.p..... 5 ml

Cada 5 ml de suspensão oral 400 mg contém:

- . amoxicilina..... 400 mg
- . ácido clavulânico (sob a forma de clavulanato de potássio)..... 57 mg
- . veículo q.s.p..... 5 ml

Veículo : goma xanthan, aspartame, ácido succínico, sílica coloidal, hidroxipropilmetilcelulose, essência de laranja, essência de framboesa, essência de caramelo, dióxido de silício.

INFORMAÇÃO AO PACIENTE - CLAVULIN BD

CLAVULIN BD age em infecções bacterianas comuns, onde o tratamento com antibióticos é indicado.

Conservar o produto ao abrigo da umidade e calor excessivo (temperatura $\leq 25^{\circ}$ C).

Tanto o pó quanto a suspensão, imediatamente após a reconstituição, apresentam uma coloração que pode variar do branco ao creme.

A suspensão oral, após reconstituição, ficará estável por 7 dias, devendo, para isso, ser conservada em refrigerador (2° C a 8° C). Se não for mantida na geladeira, a suspensão escurece gradativamente, apresentando-se amarelo-escuro após 48 horas e marrom-tijolo após 96 horas. Com 8 dias, mesmo guardada na geladeira, a suspensão torna-se amarelo-escuro e com 10 dias passa a marrom-tijolo. Portanto, após 7 dias, o produto deve ser desprezado.

O prazo de validade do produto é de 24 meses, a contar da data de sua fabricação.

NÃO USE MEDICAMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO.

Caso ocorra gravidez durante ou logo após o tratamento com **CLAVULIN BD**, suspenda a medicação e comunique imediatamente ao seu médico.

O uso de **CLAVULIN BD** é contra-indicado para pacientes com história de hipersensibilidade à penicilina.

CLAVULIN BD suspensão contém aspartame, portanto, é preciso ter cuidado.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Informe ao médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como diarreia, indigestão, náusea, vômito, prurido vaginal e urticária.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Informe ao seu médico se estiver fazendo uso de outros medicamentos.