



simeticona

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Cápsula gelatinosa mole 125mg

Embalagens contendo 10, 90, 200 e 500 cápsulas.

USO ADULTO USO ORAL

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula contém:
simeticona.....125mg

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação do medicamento: Este medicamento atua no estômago e no intestino rompendo ou dificultando a formação de bolhas gasosas que retêm os gases e que provocam flatulência e dores. Ao se tornarem livres, os gases são facilmente eliminados.

Indicações do medicamento: A simeticona é indicada para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. O acúmulo de gases no estômago e no intestino chama-se flatulência, ou seja, incômodo, estufamento, dor ou cólicas no abdômen. A eliminação dos gases aliviam estes sintomas.

Este medicamento também pode ser usado



como medicação auxiliar em exames médicos como na endoscopia digestiva, e no preparo dos pacientes para radiografia do abdômen.

Riscos do medicamento:

CONTRAINDICAÇÕES: VOCÊ NÃO DEVE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO SE TIVER ALERGIA OU SENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: COMO ESTE MEDICAMENTO É BEM TOLERADO, NÃO HÁ ADVERTÊNCIAS OU RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS SOBRE O USO.

Interações medicamentosas: Não são conhecidas interações de simeticona com outros medicamentos ou alimentos.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Modo de uso: Ao utilizar este medicamento, você deve engolir a cápsula, e não mastigá-la. As cápsulas gelatinosas são moles e fáceis de engolir.

Aspecto físico: Cápsula gelatinosa mole de cor verde.

Características Organolépticas: As cápsulas de simeticona não apresentam características organolépticas marcantes que permitam sua diferenciação em relação a outras cápsulas.

Posologia: Você pode usar este medicamento 4 vezes ao dia, após as refeições e ao se deitar, ou quando necessário.

Você não deve ingerir mais de 500mg (4 cápsulas) de simeticona.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO-DENTISTA.

Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.

Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação (VIDE CARTUCHO).

Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

REAÇÕES ADVERSAS: A SIMETICONA NÃO É ABSORVIDA PELO ORGANISMO, ATUANDO SOMENTE DENTRO DO APARELHO DIGESTIVO, E É TOTALMENTE ELIMINADA NAS FEZES, SEM ALTERAÇÕES. ASSIM, NÃO COSTUMA PROVOCAR REAÇÕES INDESEJÁVEIS NO ORGANISMO.

Conduta em caso de superdose: Não se espera que ocorram sintomas causados pelo uso exagerado de simeticona, pois este medicamento não é absorvido pelo organismo. Caso você, acidentalmente, use simeticona em uma quantidade maior do que a recomendada, você deve procurar um médico imediatamente.

Cuidados de conservação e uso: DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZE



UMIDADE.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORADO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Características farmacológicas: A simeticona é um silicone antiespumante, que apresenta ação antiflatulenta, aliviando o mal-estar gástrico causado pelo excesso de gases. Um dos problemas mais comuns enfrentados pelos médicos na prática diária é o das queixas sobre excessos de gases intestinais e a distensão abdominal por eles causada, devido à aerofagia.

A simeticona atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos líquidos digestivos, levando ao rompimento das bolhas que retêm os gases. Uma vez livres os gases são facilmente eliminados por eructações ou flatos.

Indicações: Este medicamento é indicado para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. O acúmulo de gases no estômago e no intestino chama-se flatulência, ou seja, incômodo, estufamento, dor ou cólicas no abdômen. A eliminação dos gases aliviam estes sintomas.

Este medicamento também pode ser usado como medicação auxiliar em exames médicos como na endoscopia digestiva, e no preparo dos pacientes para radiografia do abdômen.

CONTRAINDICAÇÕES: NÃO DEVE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO SE TIVER ALERGIA OU SENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto: DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

Posologia: Você pode usar este medicamento 4 vezes ao dia, após as refeições e ao se deitar, ou quando necessário. Você não deve ingerir mais de 500mg (4 cápsulas) de simeticona.

ADVERTÊNCIAS: COMO ESTE MEDICAMENTO É BEM TOLERADO, NÃO HÁ ADVERTÊNCIAS OU RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS SOBRE O USO.

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco: Não há recomendações especiais para pacientes idosos e crianças.

Interações medicamentosas: Não são conhecidas interações de simeticona com outros medicamentos ou alimentos.

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS: A SIMETICONA É FISIOLÓGICAMENTE INERTE E DESPROVIDA DE TOXICIDADE. APÓS ADMINISTRAÇÃO ORAL, A SIMETICONA É ELIMINADA PELAS FEZES DE FORMA INALTERADA.

Superdose: Não se espera que ocorram

sintomas causados pelo uso exagerado de simeticona, pois este medicamento não é absorvido pelo organismo.

Caso você, acidentalmente, use simeticona em uma quantidade maior do que a recomendada, você deve procurar um médico imediatamente.

Armazenagem: DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

Nº do lote e data de fabricação:
VIDE CARTUCHO

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva
CRF-GO nº 2.659
M.S. nº 1.0370.0572

Fabricado por:
COLBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ – 00.413.925/0001-64
Estrada dos Estudantes, Nº 349 – Bairro Rio Cotia
CEP 06707-050 – Cotia – SP
Indústria Brasileira

Registrado por:
LABORATÓRIO
TEUTO BRASILEIRO S/A.

CNPJ - 17.159.229/0001-76
VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 - DAIA
CEP 75132-140 - Anápolis - GO
Indústria Brasileira



403220/01

