

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

TAMARINE®

Cassia angustifolia Vahl + Associações

APRESENTAÇÕES

Geléia

Embalagem de 150 g

Embalagem de 250 g

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada 5g contém:

<i>Cassia angustifolia</i> Vahl	400,000 mg
(equivalente à 10 mg de senosídeos)	
<i>Tamarindus indica</i> L.	23,595 mg
(equivalente à 1,18 mg de ácido tartárico)	
<i>Cassia fistula</i> L.	23,595 mg
(equivalente à 0,00134 mg de ácido transcinâmico)	
<i>Coriandrum sativum</i> L.	10,890 mg
(equivalente à 0,00165 mg de ácido clorogênico)	
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	4,800 mg
(equivalente à 0,149 mg de ácido glicirrízico)	
*Excipientes q.s.p.	5,0 g

***Excipientes:** sacarose, ácido cítrico, hidróxido de sódio, sorbato de potássio, metilparabeno sódico, aroma composto, polpas de ameixa e maçã, água purificada.

Extrato Seco de *Cassia angustifolia Vahl*

Nomenclatura Botânica Oficial: *Cassia angustifolia Vahl*

Família: *Fabaceae*

Nomenclatura Popular: Sena

Parte da planta utilizada: folhas

Extrato Seco de *Tamarindus indica* L.

Nomenclatura Botânica Oficial: *Tamarindus indica* L.

Família: *Fabaceae, Caesalpinioideae*

Nomenclatura Popular: Tamarindo

Parte da planta utilizada: fruto

Extrato Seco de *Cassia fistula* L.

Nomenclatura Botânica Oficial: *Cassia fistula* L.

Família: *Fabaceae, Caesalpinioideae*

Nomenclatura Popular: Canafistula

Parte da planta utilizada: fruto

Extrato Seco de *Coriandrum sativum* L.

Nomenclatura Botânica Oficial: *Coriandrum sativum* L.

Família: *Apiaceae*

Nomenclatura Popular: Coentro

Parte da planta utilizada: fruto

Extrato Seco de *Glycyrrhiza glabra* L.

Nomenclatura Botânica Oficial: *Glycyrrhiza glabra* L

Família: *Fabaceae*

Nomenclatura Popular: Alcaçuz

Parte da planta utilizada: raiz

INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

As indicações de TAMARINE[®] são amplas: é indicado para o tratamento de intestino preso, tanto crônico como secundário e na preparação para os exames radiológicos e endoscópicos.

Indicações terapêuticas complementares: constipação decorrente de viagens prolongadas, período menstrual, gestação, dietas pós-operatórias e acidentes vasculares cerebrais.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

TAMARINE[®] é uma associação de diferentes plantas medicinais com efeito laxativo, incorporadas à polpa de frutas (maçãs e ameixas). TAMARINE[®] é um laxativo que provoca uma ativação fisiológica das secreções das mucosas do trato digestivo, guardando todas as características da função intestinal normal sem nenhum sinal de irritação. Sua apresentação em geléia e seu gosto agradável tornam mais fáceis sua ingestão, apresentando uma fórmula farmacêutica completamente diferente daquelas já conhecidas.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

TAMARINE[®] é contra-indicado nas reticolites (inflamação aguda do intestino) e doença de Crohn (doença crônica inflamatória intestinal). Também é contra-indicado em síndromes dolorosas abdominais de causa desconhecida. Você não deve utilizar este medicamento se apresentar hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

“Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.”

“Atenção: Este medicamento contém Açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes.”

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

O uso de TAMARINE[®] em crianças só deve ser feito quando houver indicação médica.

Em pacientes submetidos a dietas hipoglicídicas (com restrição ao consumo de açúcar), é preciso considerar que TAMARINE[®] geléia contém sacarose.

Pacientes idosos devem iniciar o tratamento utilizando metade da dose recomendada para adultos.

“Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.”

“Atenção: Este medicamento contém Açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes.”

Interação medicamentosa: usar o produto com cautela em pacientes em uso de antiarrítmicos tipo quinidina, amiodarona, vincamina, digitálicos, anfotericina B e diuréticos hipocalemiantes (furosemida, hidroclortiazida). Não há relatos de interações com alimentos.

“Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.”

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

TAMARINE® geléia deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30° C). Após aberto recomenda-se guardar em geladeira.

"Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem."

"Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original."

TAMARINE GELÉIA apresenta-se na forma de gel viscoso, aderente, contendo pequenos fragmentos de pó característico do produto de coloração marrom escuro e odor característico.

"Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo."

"Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças."

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

USO ORAL

Adultos (acima de 12 anos): uma colher das de chá (5 g) após a última refeição ou a critério médico.

Crianças menores de 12 anos: a exclusivo critério médico.

"Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião - dentista."

O uso de laxantes estimulantes deve ser feito com cautela, por isso, recomenda-se a utilização deste medicamento até que haja o alívio dos sintomas da constipação intestinal. No uso contínuo deste produto, recomenda-se não exceder o período de 7 dias sempre respeitando a dosagem recomendada. Períodos maiores de uso deste medicamento somente através de orientação médica.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

No caso de esquecimento de administração, reintroduzir a medicação para o alívio dos sintomas da constipação, não devendo, portanto, dobrar a dose porque esqueceu de tomar a dose anterior.

"Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista."

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Por ser um laxante estimulante do intestino, alguns sintomas são muito comuns, tais como, cólicas e gases intestinais.

Outros efeitos secundários podem ocorrer, desde que respeitada a dose recomendada, são eles: diarreia, dor no estômago, refluxo, vômitos e irritação.

Procure um médico na ocorrência de sintomas raros, tais como, sangue nas fezes, cólicas severas, fraqueza e hemorragia retal.

"Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento."

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?

Se a ingestão for alta deve-se procurar socorro médico a fim de aliviar os efeitos causados pelo medicamento.

"Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível." Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Reg. MS – 1.7287.0053

Farm. Resp.: Carlos Takashi Maki - CRF-SP nº 5606

HYPERMARCAS S/A.

Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, 1000 – Tamboré – Barueri – São Paulo

CEP 06465-0908

CNPJ nº 02.932.074/0013-25

Indústria Brasileira

Marca registrada

Atendimento ao Consumidor: 080077 17017 (Ligação Gratuita)

"Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica".

"Esta bula foi aprovada pela Anvisa em (dia/mês/ano)"

