

Maxiflox-D Colírio e pomada oftálmica

Ciprofloxacino e Dexametasona

Antiinfecioso e antiinflamatório hormonal

Uso adulto

Composição

	Suspensão oftálmica	Pomada oftálmica
Ciprofloxacino (base)	3 mg	3 mg
Dexametasona	1 mg	1 mg
Excipiente estéril	q.s.p. 1 ml	q.s.p. 1 g
conservante	Cloreto de benzalcônio 0,01%	Clorobutanol 0,35%

Informação técnica

O ciprofloxacino é uma fluorquinolona antibacteriana de efeito rápido que não apresenta resistência cruzada com as penicilinas, cefalosporinas, tetraciclina e aminoglicosídeos. Atua por inibição do DNA-girase bacteriano, interferindo na replicação do DNA.

Os corticóides suprimem a resposta inflamatória para uma variedade de agentes. Em uso oftálmico, a dexametasona diminui a exsudação celular e fibrinosa, diminui a infiltração tecidual, inibe a formação de colágeno e fibroblastos, retarda a regeneração epitelial, diminui a neovascularização pós-inflamatória e reduz, a níveis normais, a permeabilidade aumentada dos capilares inflamados.

Indicações

Infecções oculares causadas por microorganismos suscetíveis, quando for necessária a ação antiinflamatória da dexametasona. Blefarites, blefaroconjuntivites e conjuntivites causadas por germes sensíveis, incluindo *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis* e *Streptococcus pneumoniae*.

Contra-indicações

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula, ou a outros derivados quinolônicos. Infecções por herpes simples (ceratite dendrítica), vacínia, varicela e outras doenças virais da córnea e conjuntiva. Afecções micóticas e tuberculosas das estruturas oculares. Glaucoma. Doenças com adelgaçamento da córnea e esclera. Não deverá ser utilizado após a remoção não complicada de corpos estranhos da córnea.

Reações adversas

O uso prolongado pode resultar em midríase e aumento da pressão intra-ocular em pacientes sensíveis.

Posologia

Colírio

Instilar 1 ou 2 gotas a cada quatro horas por um período aproximado de 7 dias.

Durante as primeiras 24 a 48 horas, a dosagem pode ser aumentada para 1 ou 2 gotas a cada 2 horas, de acordo com o critério médico.

Pomada oftálmica

Aplicar cerca de 1,5 cm da pomada no saco conjuntival inferior, 3 a 4 vezes por dia, ou a critério médico. No tratamento de blefarites, aplicar 1 a 1,5 cm da pomada no saco conjuntival inferior, 3 a 4 vezes ao dia, ou a critério médico, recomendando-se reduzir gradativamente a dosagem em tratamentos prolongados.

Apresentação

Suspensão oftálmica estéril - frasco plástico conta-gotas contendo 5 ml

Pomada oftálmica estéril - bisnaga com bico oftálmico contendo 3,5 g

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA"

Maxiflox-D (ciproxacino/dexametasona): Reg. M.S. 1.1725.0022.003-3 = colírio de 5 ml e Reg. M.S. 1.1725.0022.002-5 = pomada com 3,5 g

Responsável Técnico: Dr. Morio Sato - CRF-SP: nº 0381

Nº de lote, data da fabricação e validade: vide cartucho

Fabricado por:

LATINOFARMA INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS LTDA.

R. Dr. Tomás Sepe, 489 - Cotia – SP

C.N.P.J. nº 60.084.456/0001-09 - Indústria Brasileira

Atendimento ao Consumidor (11) 4702 5322