

Deltacid®

Deltametrina

Loção, Shampoo e Sabonete

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES - DELTACID

Loção: frascos com 100 mL

Shampoo: frascos com 100 mL

Sabonete: caixas com 1 sabonete de 70 g

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÕES - DELTACID

LOÇÃO

Cada 100 mL de loção contém:

Deltametrina 20 mg

Excipientes: nonilfenol etoxilado, colônia, butil-hidroxitolueno, álcool etílico, ácido sórbico,

hidróxido de sódio, água desionizada q.s.p. 100 mL

SHAMPOO

Cada 100 mL de shampoo contém:

Deltametrina 20 mg

Excipientes: nonilfenol etoxilado, lauril éter sulfato de sódio, dietanolamina de ácido graxo de

côco, colônia, butil-hidroxitolueno, metilparabeno, propilparabeno, álcool etílico, cloreto de

sódio, ácido cítrico monoidratado, fosfato dissódico dodecaidratado, corante tartrazina (amarelo FD&C nº 5): vide item "Precauções e Advertências", água desionizada, q.s.p. 100 mL

SABONETE

Cada 100 g contém:

Deltametrina 30 mg

Excipientes: dióxido de titânio, essência, pigmento amarelo nº 1, massa para sabonete q.s.p. 1 sabonete

INFORMAÇÕES AO PACIENTE - DELTACID

Ação esperada do medicamento: DELTACID® está indicado no tratamento e profilaxia da pediculose (piolhos), da ftiíase (chatos), da escabiose (sarna) e das infestações por carrapatos em geral.

Cuidados de armazenamento/ Prazo de validade: o produto deverá ser mantido à temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz. DELTACID® Loção e Shampoo têm validade de 36 meses após a data de fabricação e DELTACID® Sabonete tem validade de 24 meses após a data de fabricação, não devendo ser utilizado após o vencimento do prazo.

Gravidez e lactação: não se conhecem riscos do uso de DELTACID® durante a (ou na suspeita de) gravidez e durante o aleitamento materno. Contudo, informe seu médico sobre a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Cuidados de administração/Interrupção do tratamento: é importante informar ao médico caso apresente qualquer tipo de doença, principalmente asma, alergias ou lesões da pele (feridas ou queimaduras).

Não usar DELTACID® para tratamento das sobrancelhas ou cílios. No caso de contato com os olhos, lavá-los por cerca de 15 minutos em água corrente e procurar orientação médica. Evitar a contaminação de alimentos pelo produto.

Não reutilizar o recipiente vazio.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Deve-se tomar cuidado ao aplicar DELTACID® próximo às cavidades naturais (olhos, boca, nariz, orelhas, genitais e ânus) para que não haja risco de absorção inadvertida pelas mucosas ou irritação local. Para se evitar o risco de inalação da substância, aplicar DELTACID® em ambiente ventilado, observando os procedimentos recomendados no item "Modo de Usar".

Devido à fácil transmissão da parasitose aos contactantes (familiares, parceiros sexuais), aconselha-se a pesquisa e tratamento dos outros afetados pelo mesmo agente.

Não há cuidados a serem tomados para a interrupção do tratamento com DELTACID®, contudo não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações adversas: DELTACID® pode causar irritação ocular e da pele. Informe seu médico sobre o aparecimento de reações desagradáveis.

" TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS".

Contra-indicações e precauções: informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

Como normas gerais de higiene, recomenda-se:

Ferver a roupa de cama e de uso pessoal, mantendo-as limpas;

Manter as unhas curtas e limpas. No caso de pediculose (piolhos) e ftiíase (chatos) manter

os cabelos curtos e limpos;

Procurar descobrir possíveis portadores e possíveis contatos com eles e seus objetos de uso;

Alertar os responsáveis por instituições coletivas frequentadas pelo portador do parasita, principalmente escolas e creches.

" NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE".

INFORMAÇÕES TÉCNICAS - DELTACID

- PROPRIEDADES

A deltametrina é a substância mais ativa da classe dos piretróides, substância sintética obtida

por esterificação do ácido crisantêmico, extraído da flor do crisântemo (*Chrysanthemum*

cinerariaefolium). A deltametrina apresenta elevado coeficiente de segurança e baixa toxicidade para mamíferos. Possui considerável efeito residual e alto poder letal contra piolhos e ácaros. A deltametrina apresenta notáveis propriedades pediculicidas e escabicidas

sendo o *Pediculus humanus capitis*, *Pediculus humanus humanus*, *Phthirus pubis* e seus ovos

extraordinariamente sensíveis à sua ação. A sua ação é seletiva e se dá após a absorção da

substância através do exoesqueleto de quitina dos ectoparasitas. Uma vez no interior do organismo do inseto, a deltametrina transportada pela hemolinfa, fixa-se nos gânglios

nervosos periféricos e nas estruturas motoras do Sistema Nervoso Central, produzindo excitabilidade, incoordenação motora, paralisia, letargia e morte do parasita.

INDICAÇÕES - DELTACID

DELTACID® está indicado no tratamento e profilaxia da pediculose (piolhos), da ftiríase (chatos), da escabiose (sarna) e das infestações por carrapatos em geral.

CONTRA-INDICAÇÕES - DELTACID

Hipersensibilidade à deltametrina.

Alergia respiratória.

Lesões de pele: feridas e queimaduras ou condições que possibilitem maior absorção.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS - DELTACID

DELTACID® está indicado somente para uso tópico.

Não deve ser ingerido ou inalado.

Deve ser mantido fora do alcance dos olhos e mucosas.

No caso de contato acidental com os olhos, lavá-los imediatamente com água corrente por alguns minutos.

No caso de infecção ou irritação da pele, interromper o tratamento.

Aviso referente à apresentação shampoo: "ESTE PRODUTO CONTÉM O CORANTE AMARELO DE TARTRAZINA QUE PODE CAUSAR REAÇÕES DE NATUREZA ALÉRGICA, ENTRE AS QUAIS ASMA BRÔNQUICA, ESPECIALMENTE EM PESSOAS ALÉRGICAS AO ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO."

Gravidez e lactação

Desconhecem-se efeitos adversos pelo uso de DELTACID® na gravidez ou lactação. Contudo deve-se considerar o risco-benefício antes da indicação.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS - DELTACID

Ainda não foram descritas interações medicamentosas com DELTACID®.

REAÇÕES ADVERSAS - DELTACID

Podem ocorrer irritação cutânea, ocular e reações de hipersensibilidade, sobretudo do tipo
alergia respiratória.

No caso do uso em pele lesada por feridas ou queimaduras, pode ocorrer maior absorção da
deltametrina com efeitos gastrintestinais e neurológicos agudos.

MODO DE USAR - EXTERNO - DELTACID

Antes do tratamento, fazer a limpeza e fervura das roupas e objetos de uso pessoal (principalmente pentes e escovas para o cabelo) do paciente e contactantes, para evitar a
reinfestação após a aplicação.

DELTACID® LOÇÃO

Pediculose: deve ser aplicado nas áreas atingidas, de preferência durante o banho, fazendo-se

ligeiras fricções com a polpa dos dedos.

Deixar as áreas atingidas ensaboadas durante 5 minutos. Enxaguar bem.

Escabiose: friccionar toda a região afetada ou todo o corpo, caso necessário, deixando permanecer até o próximo banho.

Em ambos os casos, usar por 4 dias consecutivos.

DELTACID® SHAMPOO

Deve ser aplicado nas áreas atingidas, de preferência durante o banho, fazendo-se
ligeiras

fricções com a polpa dos dedos.

Deixar as áreas atingidas ensaboadas durante 5 minutos. Enxaguar bem. Usar durante 4
dias

consecutivos.

DELTACID® SABONETE

Ensaboar energicamente toda região afetada ou todo o corpo caso necessário, deixando a

espuma permanecer durante 5 minutos. Enxaguar bem. Usar durante 4 dias
consecutivos.

Sob todas as formas o esquema de tratamento deve ser repetido 7 dias após o 4º dia de aplicação devido à possível reinfestação por permanência de ovos.

CONDUTA NA SUPERDOSAGEM - DELTACID

No caso de ingestão acidental, o tratamento é principalmente de suporte. Deve-se induzir

vômito nos indivíduos conscientes ou realizar lavagem gástrica nos inconscientes. Pode-se administrar sais catárticos para aumentar o trânsito intestinal e diminuir a absorção intestinal da piretrina. No caso de inalação acidental, pode-se necessitar de respiração artificial.

PACIENTES IDOSOS - DELTACID

Até o momento não há evidência que sugira que a resposta deste grupo etário seja diferente daquela apresentada por pacientes mais jovens.
Reg. MS-1.0082.0069