

RESFENOL

paracetamol
maleato de clorfeniramina
cloridrato de fenilefrina

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Cápsulas: cartuchos com 20 e 120 cápsulas em blísteres e frasco de vidro com 20 cápsulas
Gotas - frasco plástico com 20 ml.
Solução oral - frasco de vidro com 100 ml.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO ORAL

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula contém:

paracetamol 400 mg
maleato de clorfeniramina 4 mg
cloridrato de fenilefrina 4 mg
Excipiente q.s.p. 1 cápsula
(Excipientes: Estearato de magnésio, amido, silicato de magnésio).

Cada ml, correspondente a aproximadamente 40 gotas, contém:

paracetamol 100 mg
maleato de clorfeniramina 2 mg
cloridrato de fenilefrina 2 mg
Veículo q.s.p. 1 ml
(Veículo: Metilparabeno, propilenoglicol, sacarina sódica, álcool etílico, essência, corante amarelo crepúsculo/alaranjado e água deionizada).

Cada ml (solução oral) contém:

paracetamol 40,0 mg
maleato de clorfeniramina 0,6 mg
cloridrato de fenilefrina 0,6 mg
Veículo q.s.p. 1,0 ml
(Veículo: Metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol, sacarose, álcool etílico, essência, corante amarelo crepúsculo/alaranjado e água deionizada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Resfenol é um antigripal múltiplo, que contém substâncias que agem contra os sintomas de gripes e resfriados. Resfenol alivia a obstrução nasal, coriza, febre, cefaléia e dores musculares presentes nos estados gripais.

Cuidados de conservação: evitar calor excessivo (temperatura superior a 40°C) e proteger da luz e umidade.

Resfenol é válido por 24 meses, a partir da data de fabricação indicada na embalagem.

Não utilizar o produto se o prazo de validade estiver vencido.

Não deve ser usado na gravidez e na lactação.

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informar ao médico se está amamentando.

Caso surjam reações desagradáveis como tontura, vertigem, taquicardia, palpitações, hipertensão, desconforto gástrico e reações alérgicas cutâneas durante o tratamento com Resfenol, aconselha-se suspender o medicamento e comunicar ao médico.

ESTE MEDICAMENTO INDUZ SONOLÊNCIA NÃO DEVENDO SER UTILIZADO POR CONDUTORES DE VEÍCULOS, OPERADORES DE MÁQUINAS OU AQUELES DE CUJA ATENÇÃO DEPENDA A SEGURANÇA DE OUTRAS PESSOAS.

NÃO USE OUTRO PRODUTO QUE CONTENHA PARACETAMOL.

O produto não deve ser administrado concomitantemente com inibidores da monoamino-oxidase (MAO), com barbitúricos ou álcool.

Informar seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

Atenção diabéticos:

solução oral: contém açúcar.

cápsulas e gotas: não contém açúcar.

Em pacientes idosos é recomendado o uso sob orientação médica.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR.

NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

AS CÁPSULAS NÃO PODEM SER PARTIDAS OU MASTIGADAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

As ações farmacológicas das substâncias que formam o produto, prestam uma cobertura sintomática ampla no tratamento de gripes e resfriados, cuja ação farmacodinâmica e segurança são perfeitamente conhecidas e bem estabelecidas. O paracetamol possui atividade analgésica e antitérmica. Ambas ocorrem devido a inibição da síntese de prostaglandinas no Sistema Nervoso Central. A ação analgésica ocorre, predominantemente, no Sistema Nervoso Central e, a nível menor, através de ação periférica, bloqueando a geração de impulsos dolorosos. A ação antitérmica, ocorre no centro cerebral regulador da temperatura. O maleato de clorfeniramina é um agente antihistamínico. Tem ação contrária a da histamina, que ocasiona a maioria dos efeitos alérgicos presentes nos estados gripais. Atua na musculatura lisa do aparelho respiratório diminuindo os broncoespasmos. Diminui a permeabilidade dos pequenos vasos sanguíneos e conseqüentemente os edemas, rubores e pruridos. Tem ação sobre as glândulas exócrinas, iminuindo as secreções salivares e lacrimais. O cloridrato de fenilefrina atua sobre receptores específicos, causando uma vasoconstrição direta, promovendo o descongestionamento nasal e diminuindo a coriza e a rinite.

INDICAÇÕES

Antigripal múltiplo com ação nas gripes, resfriados, congestão nasal, coriza, febre, cefaléia, dores musculares e demais sintomas presentes nos estados gripais.

CONTRA-INDICAÇÕES

O produto é contra-indicado em pacientes com conhecida hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não deve ser administrado a pacientes com hipertensão, doença cardíaca, diabetes, glaucoma, hipertrofia da próstata, doença renal crônica, insuficiência hepática grave, disfunção tireoidiana, gravidez e lactação sem controle médico.

REAÇÕES ADVERSAS

Durante o tratamento, embora raramente, podem surgir reações adversas características, tais como: sedação, sonolência, vertigem, hipotensão, sudorese, palpitações, ansiedade, tremor, insônia, desconforto gástrico, irritações cutâneas. O uso prolongado pode provocar discrasias sanguíneas e necrose papilar renal.

ADVERTÊNCIA

As cápsulas contém o corante amarelo de TARTRAZINA, que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

PRECAUÇÕES

ESTE MEDICAMENTO INDUZ SONOLÊNCIA NÃO DEVENDO SER UTILIZADO POR CONDUTORES DE VEÍCULOS, OPERADORES DE MÁQUINAS OU AQUELES DE CUJA ATENÇÃO DEPENDA A SEGURANÇA DE OUTRAS PESSOAS. NÃO USE OUTRO PRODUTO QUE CONTENHA PARACETAMOL.

Atenção diabéticos:

solução oral: contém açúcar,
cápsulas e gotas: não contém açúcar.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O produto não deve ser administrado concomitantemente com inibidores da MAO (monoamino- oxidase), com barbitúricos ou álcool.

ALTERAÇÕES EM EXAMES LABORATORIAIS

Os testes de função pancreática utilizando a bentiromida ficam invalidados, a menos que o uso do medicamento seja descontinuado (3) três dias antes da realização do exame. Pode produzir falsos valores aumentados quando da determinação do ácido 5-hidroxiindolacético, quando for utilizado o reagente nitrosoaftol.

POSOLOGIA

Administração por via oral.

Cápsulas

Adultos: 1 a 2 cápsulas a cada 4 horas.

Crianças acima de 12 anos: 1 cápsula a cada 4 horas.

Não tomar mais de 10 cápsulas ao dia.

Gotas

De 4 a 6 anos: 30 a 40 gotas 3 a 4 vezes ao dia.

De 2 a 4 anos: 20 a 30 gotas 3 a 4 vezes ao dia.

Crianças abaixo de 2 anos: sob orientação médica.

Solução oral

Adultos e crianças acima de 12 anos: 1 colher de sobremesa (10 ml) a cada 4 horas.

Crianças de 6 a 12 anos: 1 colher de chá (5 ml) a cada 4 horas.

SUPERDOSAGEM

Promover esvaziamento gástrico através da indução de emese ou lavagem gástrica. A N-acetilcisteína, administrada por via oral, é um antídoto específico para toxicidade induzida pelo paracetamol, devendo ser instituída nas primeiras 24 horas.

Medidas de manutenção do estado geral devem ser observadas, como hidratação, balanço hídrico, eletrolítico e correção de hipoglicemia.

PACIENTES IDOSOS

É recomendado o uso sob orientação médica Data de fabricação, data de vencimento e lote Vide cartucho.

KLEY HERTZ S.A. Indústria e Comércio
Rua Com. Azevedo, 224 - Porto Alegre - RS
Farmacêutica Resp.: Paula Carniel Antonio
CRF-RS 4228 - Reg. no M.S. nº 1.0689.0135

C. N. P. J. nº 92.695.691/0001-03
INDÚSTRIA BRASILEIRA