

tamente comunicado e, provavelmente, deverá ser feita uma lavagem gástrica, devendo o paciente ser mantido sob cuidadosa observação médica.

#### **Onde e como devo guardar este medicamento?**

Conserve o produto na embalagem original e em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz.

#### **TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Nº de lote, data de fab. e validade: vide embalagens

Reg. MS nº 1.4381.0037

Farm. Resp.: Charles Ricardo Mafra

CRF-MG nº 10.883

Registrado por: **Cimed Indústria de Medicamentos Ltda.**

Rua Engenheiro Prudente, 121 - CEP: 01550-000

São Paulo/SP - CNPJ: 02.814.497/0001-07

Fabricado por: **Cimed Indústria de Medicamentos LTDA.**

Av. Cel. Armando Rubens Storino, 2750

Pouso Alegre/MG - CEP 37.550-000

CNPJ 02.814.497/0002-98

Indústria Brasileira



1300180BU1111 – 185 x 130 – PH 557



## **CARBOCIN**

carbocisteína

#### **Forma Farmacêutica e Apresentação**

Xarope: Frasco com 100 mL

#### **USO ORAL**

##### **Composição:**

##### **Xarope adulto – USO ADULTO**

Cada mL de CARBOCIN adulto contém:

carbocisteína ..... 50 mg

Veículo\* ..... qsp 1mL

\* carmelose, sacarina sódica, ciclamato de sódio, propilparabeno, metilparabeno, hidróxido de sódio, corante vermelho eritrosina, ácido cítrico, álcool etílico, aroma e água deionizada.

##### **Xarope pediátrico – USO PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS**

Cada mL contém:

carbocisteína ..... 20 mg

Veículo\* ..... qsp 1mL

\* carmelose, sacarina sódica, ciclamato de sódio, propilparabeno, metilparabeno, hidróxido de sódio, corante vermelho eritrosina, ácido cítrico, álcool etílico, aroma e água deionizada.

#### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE:**

##### **Como este medicamento funciona?**

CARBOCIN ajuda a diminuir a produção das secreções respiratórias, assim como deixa as secreções menos espessas, facilitando sua eliminação pelo organismo, quando há um excesso destas secreções por doenças respiratórias.

CARBOCIN começa a fazer efeito cerca de 1 a 2 horas após a sua administração.

##### **Por que este medicamento foi indicado?**

CARBOCIN ajuda no tratamento de problemas respiratórios, quando

há um excesso de secreções que podem piorar o estado do paciente.

#### **Quando não devo usar este medicamento?**

##### **Contraindicações**

O produto não deve ser utilizado por pacientes com úlceras pépticas ativas ou com alergia aos componentes da formulação.

##### **Advertências**

O tratamento com CARBOCIN não substitui o tratamento específico das doenças respiratórias, como a bronquite, a asma ou as infecções dos pulmões. Assim, antes de começar o tratamento com CARBOCIN, o médico deve ser consultado para diagnosticar o tipo de doença e indicar o tratamento ou medicamento específico para cada doença.

#### **POR NÃO CONTER AÇÚCAR NA SUA FORMULAÇÃO, CARBOCIN PODE SER CONSUMIDO POR PACIENTES DIABÉTICOS.**

**Este medicamento é contraindicado na faixa etária abaixo de 2 anos de idade.**

##### **Precauções**

###### Gravidez e lactação

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

###### Pacientes idosos

Não existem restrições ou precauções especiais com relação ao uso do produto por pacientes idosos.

##### **Interações medicamentosas**

###### Ingestão juntamente com outras substâncias

Durante o tratamento com CARBOCIN, você não deve fazer uso de medicamentos que inibem a tosse como os antitussígenos, bem como não deve fazer uso de medicamentos atropínicos (como, por exemplo: atropina).

**Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações desagradáveis.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo o uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode**

**ser perigoso para sua saúde.**

#### **Como devo usar este medicamento?**

**Aspecto físico:** CARBOCIN (adulto e pediátrico) é um líquido límpido e de cor rosa claro.

**Características organolépticas:** CARBOCIN (adulto e pediátrico) possui odor e sabor artificial de cereja.

**Leia com atenção o item "Modo de usar" para a utilização correta do produto.**

##### **Modo de usar**

###### Adulto:

5 a 10 mL (para medir o volume, utilize o copo-medida) do xarope, 3 vezes ao dia.

###### Pediátrico:

Crianças entre 5 e 12 anos: 5 a 10 mL (para medir o volume, utilize o copo-medida) do xarope, 3 vezes ao dia.

Atenção: Para medir o volume de CARBOCIN, utilize o copo-medida verificando a posologia a ser adotada.

**Siga corretamente o modo de usar; não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

##### **Quais os males que este medicamento pode causar?**

Às vezes, este medicamento pode causar algumas reações desagradáveis, como: dor no estômago, enjoo, diarreia, sangramento no estômago ou intestinos, alergia na pele, tontura, insônia, dor de cabeça, palpitação e leve diminuição da taxa de açúcar no sangue. Informe ao seu médico o aparecimento destas ou de quaisquer outras reações desagradáveis.

**O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?**

Nestes casos, os sintomas mais comuns que podem aparecer são: dor de estômago, enjoo, vômito e diarreia. O médico deve ser imedia-

