



CONTRA-INDICAÇÕES
HIPERSENSIBILIDADE AOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
O uso prolongado de antibióticos pode ocasionalmente favorecer a infecção por microrganismos não sensíveis.
Raros casos de hipoplasia medular, inclusive anemia aplástica, foram relatados após o uso tópico de cloranfenicol.
Produto de uso exclusivo em adultos. O uso em crianças representa risco à saúde (devido à presença de ácido bórico e seus derivados na formulação).
ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

REAÇÕES ADVERSAS
Infecções secundárias por microrganismos não sensíveis. Discrasias sanguíneas. Reações de hipersensibilidade.

POSOLOGIA
Instile 1 ou 2 gotas no olho afetado, a cada 1 ou 2 horas, de acordo com a orientação médica.

SUPERDOSAGEM
Em geral, superdosagens não provocam problemas agudos. Se, acidentalmente for ingerido, beba bastante líquido para diluir, ou procure orientação médica.

PACIENTES IDOSOS
Não existem restrições de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as outras faixas etárias.

Registro M.S. nº 1.0465.0482
Farm. Responsável: Dr Marco Aurélio Limirio G. Filho - CRF-GO nº 3524
Nº do Lote, Data de Fabricação e Prazo de Validade: **VIDE CARTUCHO**

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Prezado Cliente:

Você acaba de receber um produto **Neo Química**.
Em caso de alguma dúvida quanto ao produto, lote, data de fabricação,
ligue para nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor.



PRODUZIDO POR:
NeoLatina Comércio e Indústria Farmacêutica Ltda.
VPR-3 - Quadra 2-A - Módulos 20/21 - DAIA - CEP 75133-600 - Anápolis - GO



Laboratório Neo Química Com. e Ind. Ltda.
VPR 1 - Quadra 2-A - Módulo 4 - DAIA - Anápolis - GO - CEP 75132-020
www.neoquimica.com.br
C.N.P.J.: 29.785.870/0001-03 - Indústria Brasileira



cloranfenicol

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1.999

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES
Solução Oftálmica: embalagens contendo 1, 6", 10", 12", 25" e 50 " frascos de 10mL.
*Embalagem Hospitalar



USO ADULTO

USO OFTÁLMICO

COMPOSIÇÃO
Cada mL da solução oftálmica contém:
cloranfenicol 4mg
veículo q.s.p.....1mL
(ácido bórico, borato de sódio, cremophor RH-40, cloreto de benzalcônio e água)
28 gotas correspondem a 1mL do medicamento.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- **Ação esperada do medicamento:** cloranfenicol solução oftálmica tem ação antimicrobiana.
- **Cuidados de armazenamento:** Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Proteger da luz e umidade.
- **Prazo de validade:** 24 meses."Não use medicamento com prazo de validade vencido, além de não obter o efeito desejado, pode ser prejudicial para sua saúde". Antes de usar observe o aspecto do medicamento".
- **Gravidez e lactação:** "Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o término". "Informe seu médico se está amamentando".
- **Cuidados de administração:** instile a dose recomendada no saco conjuntival, evitando tocar a ponta do frasco nos tecidos oculares.
- **"Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento".**
- **Produto de uso exclusivo em adultos. O uso em crianças representa risco à saúde (devido à presença de ácido bórico e seus derivados na formulação).**
- **ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.**
- **Interrupção do tratamento:** "Não interromper o tratamento sem conhecimento do seu médico".
- **Reações adversas:** Informe ao médico o aparecimento de reações desagradáveis.
- **"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS".**
- **Contra-indicações e precauções:** "Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento".
- **"NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE".**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O cloranfenicol é um antibiótico que atua por inibição da síntese protéica bacteriana. Possui amplo espectro de ação antimicrobiana e é eficaz contra microrganismos Gram-positivos e Gram-negativos, tais como *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus hemolyticus* e *Moraxella lacunata* (bacilo de Morax-Axenfeld).

INDICAÇÕES

Infecções oculares superficiais, envolvendo a córnea e/ou a conjuntiva, causadas por microrganismos sensíveis ao cloranfenicol.



08:20 h - 11/02/09

DATA IMPRESSÃO:	APROVAÇÃO TÉC.:	ASSINATURA	DATA	HORÁRIO
	RESP. REVISÃO			
	RESP. SEDEV			
	APROVAÇÃO FINAL:			
	SEREG/GENÉRICO			
	RT			

OBS.: Lançamento.

VERSÃO 12