

Papuless

nicotinamida 40mg/g

GEL 4%

Uso adulto e pediátrico

Uso externo

## APRESENTAÇÃO

Embalagem contendo bisnaga com 25 g.

## COMPOSIÇÃO

Cada g de PAPULESS® gel contém:

Nicotinamida.....0,04 g

Excipiente gel....q.s.p. ....1 g

(Glicerina, Propilenoglicol,  
Carbomero, Metilparabeno,

Essência de Alecrim, Álcool a 96°GL e Água Destilada)

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Cuidados de conservação:  
Conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C).

Prazo de Validade: 24 meses contados a partir da data de fabricação. Vencido o prazo, não utilize o produto.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez, ou uso de outros medicamentos durante o tratamento.

Siga corretamente o modo de usar. Não use o medicamento com frequência e por período superior ao recomendado pelo médico.

Não interrompa o tratamento sem antes consultar seu médico.

Informe sempre ao seu médico o aparecimento de reações adversas.

Medicamento de uso exclusivamente externo. Evite contato com os olhos, boca e mucosas. Lave as mãos após aplicação. Se houver contato acidental do medicamento com os olhos, lave-os profusamente com água.

**“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO**

**FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.”**

“NÃO USE MEDICAMENTO SEM  
CONHECIMENTO DO  
SEU MÉDICO, PODE SER  
PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.”

## MECANISMOS DE AÇÃO

São vários os mecanismos de ação da nicotinamida, incluindo varredura de elétrons, inibição da 3'-5'-AMP-fosfodiesterase e/ou aumento da conversão do triptofano em serotonina.

Entretanto sua atividade anti-inflamatória pode estar relacionada à sua ação direta sobre os mediadores da inflamação, como histamina, inibição de neutrófilos, supressão da transformação de linfócitos e

habilidade em bloquear a liberação de histamina dos mastócitos.

O anel piridínico da nicotinamida pode ser um modulador fenotípico para alguns micro-organismos, e também possui atividade contra uma grande variedade de doenças inflamatórias cutâneas.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O efeito terapêutico do PAPULESS® na acne vulgar parece envolver principalmente a inibição da 3'-5'-fosfodiesterase e a transformação do linfócito antígeno induzido, o que inibe a proliferação epitelial da unidade pilo-sebácea, fator primário no

desenvolvimento das lesões acneicas.

## INDICAÇÕES

PAPULESS® é uma alternativa aos antibióticos nos tratamentos tópicos da acne inflamatória.

PAPULESS® não é um antibiótico, e conseqüentemente, não induz à resistência bacteriana. Foi demonstrado que possui efeito similar ao da clindamicina.

## CONTRAINDICAÇÕES

Em pacientes com antecedentes de hipersensibilidade aos componentes da formulação.

## PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

PAPULESS® é somente para uso externo e não deve ser aplicado na área dos olhos e membranas mucosas.

## GRAVIDEZ E LACTAÇÃO

A nicotinamida está presente em todas as células vivas e é consumida na dieta. Como tal, pode ser considerada como um composto seguro.

A nicotinamida é excretada no leite materno.

Como para todo medicamento, recomenda-se cuidados durante o primeiro trimestre da gravidez.

## INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não é conhecido nenhum tipo de interação de PAPULESS® com outros medicamentos.

## REAÇÕES ADVERSAS

A reação adversa mais frequente é a secura da pele. Outras reações menos frequentes incluem:

prurido, eritema, sensação de queimação e irritação no local da aplicação.

PAPULESS® não é fototóxico nem fotoalergênico.

## POSOLOGIA E MODO DE USO

Limpar a área afetada com água morna e sabão. Aplicar



uniformemente PAPULESS® sobre a área afetada, duas vezes ao dia, ou a critério médico.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

IGEFARMA LABORATÓRIOS S.A.

Marginal Direita da Via Anchieta,  
km 13,5

São Bernardo do Campo - SP

CEP: 09696-005

CNPJ 61.517.397/0001-88

Indústria Brasileira

Farmacêutica Responsável:

Dra. Rosa Maria Scavarelli - CRF -  
SP 6.015

MS 1.0191.0285.001-8