

ACULAR COL.. 5% 5ML

Composição - ACULAR

cada ml contém 5,0 mg de cetorolac detrometamina, 0,1 mg de cloreto de benzalcônio, 1,0 mg de edetato dissódico, octoxinol 40, cloreto de sódio, ácido clorídrico e/ou hidróxido de sódio para ajuste de pH e água purificada.

Posologia e Administração - ACULAR

1 gota (0,25 mg) quatro vezes ao dia para alívio do prurido ocular devido à conjuntivite alérgica sazonal. A eficácia de **Acular** solução oftálmica não foi estabelecida além de uma semana de terapia. - Conduta na superdosagem: nem sempre a superdosagem causará problemas agudos. Se uma dose excessiva for colocada acidentalmente no olho, este deverá ser lavado abundantemente com água ou soro fisiológico. Se for ingerido acidentalmente, tomar líquidos para diluir.

Precauções - ACULAR

gerais: recomenda-se que **Acular** solução oftálmica estéril a 0,5% seja usado com cautela em pacientes com conhecidas tendências hemorrágicas ou que estejam recebendo outras medicações que podem prolongar o tempo de sangramento. Não existem estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas. Cetorolac de trometamina deve ser usado durante a gravidez somente se o benefício potencial justificar o risco potencial para o feto. Deve-se ter cautela ao administrar **Acular** a mulheres que amamentam. Não foram estabelecidas a segurança e a eficácia em crianças. - Interações medicamentosas: há o potencial para sensibilidade cruzada com o ácido acetilsalicílico, derivados do ácido fenilacético e outros agentes antiinflamatórios não-esteróides. Portanto, deve-se ter cautela ao tratar indivíduos com sensibilidade anteriormente exibida a essas drogas. Com algumas drogas antiinflamatórias não-esteróides, há o potencial para aumento do tempo de sangramento devido à interferência com a agregação de trombócitos. Têm havido relatos de que drogas antiinflamatórias não-esteróides de aplicação ocular podem causar sangramento aumentado dos tecidos oculares (incluindo hifemas) em conjunção com cirurgia ocular.

Reações adversas - ACULAR

em pacientes com conjuntivite alérgica, os eventos adversos mais frequentes reportados com o uso de **Acular** solução oftálmica têm sido dor aguda e ardor transitórios à instilação. Tais eventos foram reportados em aproximadamente 40% dos pacientes tratados com **Acular** solução oftálmica. Em todos os estudos de desenvolvimento conduzidos, outros eventos adversos reportados durante tratamento com **Acular** incluem irritação ocular, reações alérgicas, infecções oculares superficiais e ceratite superficial.

Contra-Indicações - ACULAR

em pacientes durante o uso de lentes de contato gelatinosas e em pacientes com hipersensibilidade anterior demonstrada a qualquer dos ingredientes da formulação.

Indicações - ACULAR

Acular solução oftálmica é indicado para o alívio do prurido ocular devido à conjuntivite alérgica sazonal.

Apresentação - ACULAR

frascos plásticos conta-gotas contendo 5 ml.