

## **Composição - CLORANFENICOL**

**cloranfenicol** 4 mg, veículo q.s.p. 1 ml. Veículo basicamente constituído de ácido bórico, borato de sódio, tiomersal, polivinilpirrolidona, propilparabeno e metilparabeno.

## **Posologia e Administração - CLORANFENICOL**

instilar 1 ou 2 gotas no olho afetado, a cada 1 ou 2 horas, de acordo com a orientação médica.

## **Precauções - CLORANFENICOL**

o uso prolongado de antibióticos pode ocasionalmente favorecer a infecção por microrganismos não sensíveis. - Advertências: raros casos de hipoplasia medular, inclusive anemia aplástica, foram relatados após o uso tópico de **Cloranfenicol**.

## **Reações adversas - CLORANFENICOL**

infecções secundárias por germes não sensíveis. Discrasias sangüíneas. Reações de hipersensibilidade.

## **Contra-Indicações - CLORANFENICOL**

hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

## **Indicações - CLORANFENICOL**

infecções oculares superficiais, envolvendo a córnea e/ou a conjuntiva, causadas por germes sensíveis ao **cloranfenicol**.

## **Apresentação - CLORANFENICOL**

solução oftálmica, apresentada em frasco plástico conta-gotas, hermeticamente fechado e estéril, com 10 ml.