

- Código: 71955BR11X
- DWN: 0249001
- Dimensões: 115 x 210 mm
- Laetus: 194
- Escala 100%

Nº DE CORES: 01 COR



mirabel®

cloridrato de tetrizolina 0,05% sulfato de zinco 0,1%

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO
Frasco plástico conta-gotas contendo 10 ml de solução oftálmica estéril.

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO
SOLUÇÃO OFTÁLMICA
Cada ml contém: 0,5 mg de cloridrato de tetrizolina e 1 mg de sulfato de zinco.
Veículo: azul de metileno, ácido bórico, citrato de sódio, polissorbato 80, cloreto de benzalcônio e água purificada q.s.p..

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

- Ação esperada do medicamento: ação vasoconstritora e anti-séptica.
- Cuidados de armazenamento: o produto deve ser armazenado à temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e ao abrigo da luz.
- Prazo de validade: vide cartucho. Não use medicamento com prazo de validade vencido.
- Gravidez e lactação: informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando.
- Cuidados de administração: instile a dose recomendada, no saco conjuntival, evitando tocar a ponta do frasco nos tecidos oculares. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
- Interrupção do tratamento: não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
- Reações adversas: informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

- Contra-indicações e precauções: informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE

Informação Técnica

O cloridrato de tetrizolina é um agente simpatomimético com ação vasoconstritora. Proporciona alívio sintomático do edema e hiperemia conjuntival causados por alergias oculares, pequenas irritações locais ou conjuntivites.
O sulfato de zinco atua como anti-séptico e adstringente suave, coadjuvando os efeitos da tetrizolina.

Indicações
Edema de conjuntiva, hiperemias secundárias, conjuntivites catarrais e irritativas não específicas, causadas por poluição, poeira, vento, etc.

Contra-Indicações
Pacientes sensíveis a algum dos componentes da fórmula. Glaucoma de ângulo fechado ou estreito.

Precauções e Advertências

O produto é desaconselhável para menores de 7 anos de idade. Evite instilações repetidas em pacientes com hipertensão arterial e hipertireoidismo.

Interações Medicamentosas

O produto deve ser usado com cautela em pacientes sob tratamento com inibidores da MAO, uma vez que uma eventual absorção sistêmica significativa poderá provocar crise hipertensiva.

Reações Adversas

Tratando-se de produto com ação simpatomimética, pode ocorrer certo grau de midríase.

Posologia

Instile no saco conjuntival 2 a 3 gotas, 2 a 3 vezes por dia.

Superdosagem

Em geral, superdosagens não provocam problemas agudos. Se acidentalmente, for ingerido, beba bastante líquido para diluir, ou procure orientação médica.

Pacientes Idosos

Não existem restrições de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as outras faixas etárias.

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Reg. MS/ANVISA - 1.0147.0166
Farm. Resp.: Dra. Flávia Regina Pegorer
CRF-SP nº 18.150



Sentido de Leitura
Cód. Laetus nº 194

Sentido de Leitura
Cód. Laetus nº 194



Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia
ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Av. Guarulhos, 3.272 - CEP 07030-000 - Guarulhos - SP
CNPJ 43.426.626/0009-24
Indústria Brasileira
® Marca Registrada

Texto adaptado à portaria 110/97

71955BR11X - Laetus: 194

Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800-144077
Discagem Direta Gratuita