

# Magnopyrol

Dipirona sódica

## Uso adulto e pediátrico

### Formas farmacêuticas e apresentações - MAGNOPYROL (dipirona sódica)

Comprimidos: Embalagens com 100 e 200 comprimidos. MAGNOPYROL (dipirona

sódica) Gotas: Frascos com 10, 15 e 20 ml. MAGNOPYROL (dipirona sódica)

Solução oral: Frasco com 100 ml, acompanha copo-medida graduado. MAGNOPYROL (dipirona sódica) Supositório infantil: Embalagem com 5 supositórios.

**Composição** - Comprimidos: Cada comprimido contém 500 mg de dipirona sódica. Excipientes: Povidona, amido de milho, estearato de magnésio. Gotas: Cada ml contém 500 mg de dipirona sódica. Excipientes: Fosfato de sódio monobásico, hidróxido de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, aroma de hortelã, corante amarelo FD & C no 10, edetato dissódico, metabissulfito de sódio, glicerol, ácido clorídrico, água. Solução oral: Cada ml contém 50 mg de dipirona sódica. Excipientes: Sacarose, benzoato de sódio, essência de caramelo, essência de chocolate, metabissulfito de sódio, corante caramelo, edetato dissódico, água. Supositório infantil: Cada supositório contém 300 mg de dipirona sódica. Excipientes: Lecitina vegetal, corante amarelo FD & C no 10, corante vermelho FD & C no 3, lipobase.

**Indicações** - Como analgésico de uso geral e em analgesia obstétrica. Como antipirético, em estados febris de qualquer natureza. Como antiespasmódico em cólicas de diversas origens.

**Contraindicações** - A dipirona sódica está contraindicada em indivíduos sabidamente alérgicos aos derivados pirazolônicos ou com determinadas doenças metabólicas, tais como porfiria hepática e deficiência congênita de glicose-6-fosfato desidrogenase. Como os demais analgésicos, a dipirona não deve ser administrada em altas doses ou por tempo prolongado, sem controle médico. Está igualmente contraindicada no primeiro trimestre da gestação.

**Posologia** - Comprimidos: Adultos e adolescentes acima de 15 anos: 1 a 2 comprimidos até 4 vezes ao dia. Doses maiores, somente a critério médico. Gotas: Cada 1 ml da solução é equivalente a 20 gotas, quando o frasco for mantido na posição vertical, para gotejar a quantidade pretendida de gotas, como a seguir indicado. As dosagens se aplicam a pacientes de peso normal. Doses maiores, somente a critério médico. Adultos e adolescentes acima de 15 anos: 20 a 40 gotas em administração única ou até o máximo de 40 gotas 4 vezes ao dia. As crianças devem receber MAGNOPYROL (dipirona sódica) Gotas conforme o seu peso, seguindo a orientação deste esquema:

Peso (média de idade)	Dose gotas	No de
5 a 8 kg	Dose única	2 a 5
(3 a 11 meses)	Dose máxima diária	20 (4 x 5 gotas)
9 a 15 kg	Dose única	3 a 10
(1 a 3 anos)	Dose máxima diária	40 (4 x 10 gotas)
16 a 23 kg	Dose única	5 a 15
(4 a 6 anos)	Dose máxima diária	60 (4 x 15 gotas)
24 a 30 kg	Dose única	8 a 20
(7 a 9 anos)	Dose máxima diária	80 (4 x 20 gotas)
31 a 45 kg	Dose única	10 a 30
(10 a 12 anos)	Dose máxima diária	20 (4 x 30 gotas)
46 a 53 kg	Dose única	15 a 35
(13 a 14 anos)	Dose máxima diária	40 (4 x 35 gotas)

Crianças menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5 kg não devem ser tratadas com MAGNOPYROL (dipirona sódica), a menos que seja absolutamente necessário. Neste caso a dose de 1 gota até 3 vezes ao dia não deve ser excedida. Solução oral: Acompanha 1 copo-medida graduado. Adultos e adolescentes acima de 15 anos: 10 a 20 ml em administração única ou até no máximo 20 ml, 4 vezes ao dia. As crianças devem receber MAGNOPYROL (dipirona sódica) Solução oral conforme o seu peso, seguindo a orientação deste esquema:

Peso Solução oral	Dose	
(média de idade)	(ml)	
a 8 kg	Dose única	1,25 a 2,5
(3 a 11 meses)	Dose máxima diária	10 (4 x 2,5 ml)
9 a 15 kg	Dose única	2,5 a 5
(1 a 3 anos)	Dose máxima diária	20 (4 x 5 ml)
16 a 23 kg	Dose única	3,75 a 7,5
(4 a 6 anos)	Dose máxima diária	30 (4 x 7,5 ml)
24 a 30 kg	Dose única	5 a 10
(7 a 9 anos)	Dose máxima diária	40 (4 x 10 ml)
31 a 45 kg	Dose única	7,5 a 15
(10 a 12 anos)	Dose máxima diária	60 (4 x 15 ml)
46 a 53 kg	Dose única	8,75 a 17,5
(13 a 14 anos)	Dose máxima diária	70 (4 x 17,5 ml)

Doses maiores, somente a critério médico.

Supositório infantil: Um supositório até 4 vezes ao dia. Se forem necessárias doses maiores, devem ser administradas as formas orais. Crianças com menos de 4 anos não devem ser tratadas com supositórios.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

SAC: 0800-114033.

Registro no M.S. 1.0394.0477.

FARMASA - Laboratório Americano de Farmacoterapia S.A.