

## **Umckan®**

*Pelargonium sidoides*

Extrato Eps 7630

**Nomenclatura botânica:** *Pelargonium sidoides*, D.C.

**Nomenclatura popular:** Umckaloabo

**Família:** *Geraniaceae*

**Parte utilizada:** raízes

### **APRESENTAÇÕES**

Solução oral – extrato etanólico das raízes de *Pelargonium sidoides* D.C. Eps 7630 - 825 mg. Embalagens com 20 ml e 50 ml.

### **VIA ORAL**

### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 1 ANO**

### **COMPOSIÇÃO**

Cada 1 ml contém:

extrato etanólico\* das raízes de *Pelargonium sidoides* (1:9-11)\*\* ..... 825 mg;

excipiente q.s.p. .... 1 ml.

(glicerol 85%)

\*\* padronizado em 0,08% a 0,32% de fenóis totais.

\* cada 5 gotas do produto contém 0,03 ml de etanol.

Cada 1 ml da solução equivale a 21 gotas.

### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

#### **PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Umckan® é indicado para infecções do trato respiratório, ouvido, nariz e garganta, tais como rinofaringite (inflamação da garganta), amigdalite (dor, febre e inflamação da garganta), sinusite (seios paranasais infectados ou inflamados) e bronquite (tosse, tosse seca e tosse com catarro).

#### **COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Umckan® é um fitomedicamento que atua nas infecções das vias respiratórias. Os efeitos antimicrobianos e a modulação da resposta imune (defesa do organismo) são considerados suas ações principais.

#### **QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Umckan® não deve ser administrado nas situações a seguir:

- Pacientes com tendência a sangramento.
- Pacientes em uso de anticoagulantes (ex. heparina e varfarina).

- Doença do fígado.
- Doença dos rins.
- Hipersensibilidade (alergia) ao *Pelargonium sidoides* ou a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Este medicamento é contraindicado para uso por lactantes (mulheres amamentando).**

## **O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Precauções e advertências**

Devido à insuficiência de estudos clínicos específicos em crianças menores de um ano de idade, não é recomendado o uso desse produto nesta faixa etária.

### **Interações medicamentosas**

Não foram relatados casos de interações medicamentosas, mas, devido à presença de pequena quantidade de cumarínicos no fitomedicamento, é possível que ocorra aumento da ação anticoagulante de fármacos como heparina e varfarina, em caso de administração simultânea.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.**

**Informe seu médico da ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término.**

**Informe seu médico se está amamentando.**

**Informe seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento de seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

## **ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Cuidados de conservação**

Umckan® deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) em sua embalagem original.

Extratos vegetais líquidos apresentam tendência à turvação, sendo assim, como Umckan® é constituído de extrato vegetal, pode ocorrer pequena variação na sua cor ou sabor, o que não altera a eficácia do produto.

### **Prazo de validade**

24 meses após a data de fabricação impressa no cartucho.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Após aberto, válido por três meses.**

### **Característica física**

Solução oral - líquido marrom claro a marrom avermelhado.

### **Característica organoléptica**

Odor característico.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

#### **Modo de usar**

- Coloque o frasco na posição vertical com a tampa para cima e gire-a até romper o lacre.
- Vire o frasco com o conta-gotas para baixo e bata levemente com o dedo no fundo do frasco para iniciar o gotejamento. A primeira gota demorará um pouco a sair, mas as demais sairão normalmente.
- Não administre o medicamento diretamente na boca, utilize um recipiente para pingar as gotinhas. Este medicamento deve ser administrado por via oral, com pequena quantidade de líquido, conforme posologia, meia hora antes das refeições.

#### **Posologia**

- Infecções agudas

Adultos e crianças acima de 12 anos de idade: tomar 30 gotas, três vezes ao dia.

Crianças de seis a 12 anos de idade: tomar 20 gotas, três vezes ao dia.

Crianças de um a cinco anos de idade: tomar 10 gotas, três vezes ao dia.

- Infecções crônicas ou recorrentes

Como tratamento subsequente, com o objetivo de profilaxia da recorrência, no caso de evolução crônica da doença e recorrência frequente, a dose administrada deve ser:

Adultos e crianças maiores de 12 anos: 20 gotas três vezes ao dia.

A duração média do tratamento é de cinco a sete dias, não devendo exceder três semanas.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

### **O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Em caso do esquecimento de uma dose, continue o tratamento conforme prescrição, a partir da próxima dose prevista.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou do seu médico.**

## **QUE MALES ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?**

### **Reações adversas**

Reações raras (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): podem ocorrer alterações gastrointestinais como dor de estômago, náuseas e diarreia; leve sangramento gengival ou nasal ou reações de hipersensibilidade (alergia), como erupção cutânea, urticária e coceiras.

Ao surgirem os primeiros sinais de reações de hipersensibilidade (alergia) tais como erupção cutânea interrompa o uso do medicamento e procure orientação médica.

**Informe seu médico ou farmacêutico do aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.**

**Informe também à empresa através do seu Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).**

## **O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Umckan<sup>®</sup> é um medicamento fitoterápico bem tolerado. Não existem estudos em caso de superdosagem.

Em caso de superdosagem deve-se procurar imediatamente atendimento médico, para que sejam adotadas medidas habituais de controle das funções vitais.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

### **Venda sob prescrição médica.**

MS: 1.0390.0170

Farm. Resp:

Dra. Marcia Weiss I. Campos

CRF-RJ nº 4499

Fabricado por:

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Willmar - Schwabe Strasse 4, 76227,

Karlsruhe – Alemanha

Registrado por:

**FARMOQUÍMICA S/A**

Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 33.349.473/0001-58



Importado e embalado por:

**FARMOQUÍMICA S/A**

Umckan – AR040311 - paciente

Rua Viúva Cláudio, 300

Rio de Janeiro - RJ.

CNPJ: 33.349.473/0003-10

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**



<b>Histórico de Revisões</b>		
Revisão	Data	Descrição
00	04/12/2008	Emissão inicial – Projeto padronização de bulas – Consultoria Oriens
00	01/03/2010	Adequação à RDC 47/2009
01	26/04/2010	Adequação a atualização da RDC 47/2009 (monique)
02	10/05/2010	Revisão área médica (Fernanda tebet) e atualização (monique)
	14/05/2010	Definição da posologia (Fernanda) e atualização (Monique)
03	11/08/2010 até 19/08/2010	Atendimento a exigência n° 007772/10, expediente n° 518556/10-4 (Monique e Fernanda Tebet)
04	31/03/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alinhamento com a RDC 71 de rotulagem, com inclusão do ‘registrado por:’ e exclusão do ‘e distribuído’</li> <li>• Alterar frase de gravidez do item de contraindicação para precauções e advertências por ser categoria C.</li> </ul> Monique

