

APROVADO

BULA GASTROMAX
Reg. M.S.: 1.1560.0048
Medidas: 105x160mm
Bula nº 4000917/R0

Histórico de Revisão:
Adequação da bula segundo assuntos regulatórios
Mudança de códigos antes era 0300775/R2

Juliana B. de Lima
assinatura 25/03/11

Cáritis
assinatura 31/03/11

GASTROMAX

hidróxido de alumínio - DCB: 04694



I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: **Gastromax**
Nome genérico: **hidróxido de alumínio (DCB 04694)**

APRESENTAÇÕES

GASTROMAX comprimidos – 300mg – Embalagem contendo 200 comprimidos.

USO ORAL USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de **GASTROMAX** contém:
hidróxido de alumínio300 mg
Excipientes q.s.p. I comprimido
(água purificada, sacarina sódica, amido, ciclamato de sódio, amidoglicolato de sódio, aroma de menta, talco, celulose microcristalina e laurilsulfato de sódio).

II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

GASTROMAX é um antiácido indicado na acidez estomacal, queimação, desconforto estomacal, dor de estômago e má digestão.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O hidróxido de alumínio reage quimicamente para neutralizar ou tamponar quantidades de ácidos estomacais. Esta ação resulta em um aumento no valor do pH do conteúdo estomacal, e, por consequência, há um alívio nos sintomas de hiperacidez.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O hidróxido de alumínio não deve ser administrado em pacientes com insuficiência renal ou portadores de uropatia obstrutiva. O uso de antiácido contendo alumínio é contraindicado em pacientes com sintomas de apendicite, uma vez que estes medicamentos podem aumentar o risco de perfuração em virtude do efeito constipante.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Pode ocorrer hiperalbuminemia em pacientes com insuficiência renal crônica. O hidróxido de alumínio na vigência de dietas hipofosforadas pode provocar uma deficiência de fósforo.

Ingestão concomitante com outras substâncias: a absorção de alguns medicamentos pode ser alterada com o uso concomitante de antiácidos. Consequentemente, sempre que possível, deve-se evitar a administração de outras drogas durante uma a duas horas após o uso de antiácidos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

GASTROMAX deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 a 30°C), protegido da luz e da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: **vide embalagem.**

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. GASTROMAX é um comprimido circular de coloração branca e sabor menta. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Úlcera duodenal: Ingerir 2 a 4 comprimidos, via oral, com intervalos de 2 a 4 horas, cerca de uma hora após cada refeição.

Alívio da azia e queimação: Ingerir 2 a 4 comprimidos, via oral, cerca de uma hora após as refeições.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Antiácidos contendo alumínio podem causar constipação intestinal. O uso prolongado de hidróxido de alumínio por indivíduos ingerindo uma dieta pobre em fósforo pode provocar osteomalácia e miopatia proximal. Intolerância à ação adstringente do hidróxido de alumínio pode se revelar por náuseas e vômitos, assim como por constipação intestinal.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

8. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

No caso de superdosagem, recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III - DIZERES LEGAIS

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

MS 1.1560.0048

Farm. Resp.: Dra. Michele Caldeira Landim - CRF/GO: 5122

Fabricado por:

CIFARMA – Científica Farmacêutica Ltda.
Av. das Indústrias, 3651 – Bicas
CEP: 33040-130 – Santa Luzia / MG
CNPJ: 17.562.075/0003-20 – Indústria Brasileira

Registrado por:

CIFARMA – Científica Farmacêutica Ltda.
Rod. BR 153 Km 5,5 – Jardim Guanabara
CEP: 74675-090 – Goiânia / GO
CNPJ: 17.562.075/0001-69 – Indústria Brasileira

