

Bacrocín

®

Mupirocína

- Forma farmacêutica e apresentação:

Creme a 2%: cartucho contendo 1 bisnaga com 15 g.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO.

Composição:

Cada g de **Bacrocín ® creme** contém:

Mupirocína 20 mg

(Excipientes: polietilenoglicol 400 e polietilenoglicol 3350).

- INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento:

Bacrocín ® creme é indicado para o tratamento de infecções de pele causadas por germes sensíveis à mupirocína, agente antibacteriano que atua sobre bactérias gram-positivas e algumas bactérias gram-negativas.

Cuidados de armazenamento:

Conservar o produto hermeticamente fechado, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz e umidade.

Prazo de validade:

O prazo de validade do produto é de 24 meses a partir da data de fabricação.

"NÃO USE MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO, PODE SER PREJUDICIAL PARA SUA SAÚDE."

Gravidez e lactação:

Embora os estudos de reprodução realizados em animais, usando doses sistêmicas de até 100 vezes as doses tópicas recomendadas para uso humano, não tenham revelado qualquer evidência de diminuição de fertilidade ou lesões nos fetos relacionadas com a mupirocína, não existem, contudo, estudos controlados adequados em mulheres grávidas. Portanto, o uso desta droga durante a gravidez deve ser evitado, a menos que, a critério médico, os benefícios terapêuticos superem os riscos potenciais.

Alguns cuidados devem ser considerados para o uso do produto

durante o período de lactação.

Se o seio que está amamentando necessitar do uso de mupirocina, a amamentação, nesse seio, deverá ser descontinuada temporariamente e o leite descartado durante o tratamento. Caso ocorra gravidez durante ou logo após o tratamento com **Bacrocín® crem** e, suspenda a medicação e comunique imediatamente ao seu médico.

"Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término fixando o prazo quando for o caso. Informar ao médico se está amamentando".

Cuidados de administração:

Limpar a área afetada antes da aplicação de **Bacrocín® crem** e. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

- Interrupção do Tratamento:

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Somente ele sabe o momento correto de interromper o tratamento.

- Reações Adversas:

Reações de sensibilização local tem sido raramente reportadas durante o uso de **Bacrocín® creme**.

Algumas reações adversas que podem ocorrer são: prurido, eritema, sensação de ardência e ferroadada, dor aguda e ressecamento da pele. Informe seu médico sobre o aparecimento de reações desagradáveis.

"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS."

- Utilização concomitante com outros medicamentos:

Não há até o momento relato de interações medicamentosas entre

a mupirocina e outras drogas quer seja aumentando ou diminuindo as respectivas ações.

- Contra-indicações e Precauções:

Bacrocín® creme não deve ser utilizado em casos de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Evitar o contato do produto com os olhos, nariz e boca. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

Riscos de automedicação:

"NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MEDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE."

- INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características

Bacrocín® creme contém como princípio ativo a mupirocina, um antibiótico obtido de culturas de *Pseudomonas fluorescens*, que em termos de estrutura química e mecanismo de ação, não apresenta qualquer relação com outra classe de antibióticos conhecidos até o momento. Sua ação é bactericida em concentrações elevadas, como as que se alcançam quando se utiliza a administração tópica.

BACROCIN - Laboratório

VALEANT FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.

Rua Mário Junqueira da Silva, 736/766

Campinas/SP

Tel: 0800 16 6116